

genéricos althaia



EXCLUSIVOS e SEMIEXCLUSIVOS



mirabegrona

50 mg

(30 comprimidos)

G exclusivo

Myrbetric® (Astellas Farma)



bromidrato de **vortioxetina**

5 | 10 | 15 | 20 mg

(30 comprimidos)

G exclusivo

Brintellix® (Lundbeck)



etodolaco

500 mg

(14 comprimidos)

G exclusivo

Flancox® (Apsen)



risedronato sódico

150 mg

(02 comprimidos)

G exclusivo

Risedross® (EMS)

REFERÊNCIA COMERCIAL



cloridrato de

propafenona 150 mg

(60 e 90 comprimidos)

G exclusivo

Vatis® (Libbs)



succinato de
desvenlafaxina

50 | 100 mg

(60 comprimidos)

G semiexclusivo

Pristiq® (Wyeth)



vildagliptina 50 mg +

cloridrato de **metformina**

500 | 850 | 1.000 mg

(60 comprimidos)

G exclusivo

Galvus MET® (FQM)

REFERÊNCIA COMERCIAL



bromidrato de **vortioxetina**

10 | 15 mg

(60 comprimidos)

G exclusivo

Brintellix® (Lundbeck)



telmisartana

40 | 80 mg

(60 comprimidos)

G exclusivo

Bramicar® (EMS)

REFERÊNCIA COMERCIAL



telmisartana

40 | 80 mg

(30 comprimidos)

G exclusivo

Bramicar® (EMS)

REFERÊNCIA COMERCIAL



rosuvastatina

cálcica 40 mg

(30 comprimidos)

G semiexclusivo

Crestor® (Astrazeneca)



prednisolona

40 mg

(10 comprimidos)

G semiexclusivo

Predsim® (Mantecorp)

REFERÊNCIA COMERCIAL

althaia

[illegible][illegible][illegible]

1 comprimido 40 mg e 80 mg; embalagem com 30 ou 60 comprimidos. USO ORAL. USO ADULTO. INDICAÇÕES: nisartana é indicada para o tratamento da hipertensão arterial (pressão alta). Pode ser usada isoladamente ou em associação com outros medicamentos com a mesma finalidade. CONTRAINDICAÇÕES: Você não deve usar este medicamento se: tem alergia aos seus componentes ou aos demais componentes da fórmula; apresenta obstrução das vias que conduzem a bile; tem problemas graves no fígado; tem intolerância à frutose (contém sorbitol); apresentar diabetes mellitus ou problemas nos rins (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73m²) e está fazendo uso concomitante de alicurônio. Este medicamento é contraindicado durante a gravidez, especialmente no segundo e terceiro trimestre de gestação (de 4 a 9 meses) e durante a amamentação. PRECAUCOES E ADVERTÊNCIAS: Hipertensão renovoascular; 1

[illegible]

Atenção: embalagem com 50 mg; embalagem com 30 comprimidos revestidos. USO ORAL. **AUAD PARA INDICAÇÕES:** Este medicamento é indicado para o tratamento dos sintomas de **exatiga herpativa**, tais como: necessidade repentina de evitar a bexiga; pressão para urinar a bexiga mais do que o habitual; não ser capaz de controlar quando precisa ir a bexiga. **CONTRAINDICAÇÕES:** Este medicamento é contraindicado para pacientes que apresentem alergia conhecida ou desconhecida (alergia) à mirabegrona ou qualquer um dos outros ingredientes e/ou se estiver amamentando. **PRECAUCOES E ADVERTENCIAS:** Se tiver dificuldade para esvaziar a bexiga ou viver um pouco de urina fraco, ou se temar outros medicamentos para o tratamento da bexiga herpativa, problemas renais ou hepáticos, seu médico pode precisar reduzir a dose ou pode desaconselhar o uso de mirabegrona; pressão arterial muito alta não controlada; uma anormalidade no ECG (exame de "traçado cardíaco"). Este medicamento pode causar reações alérgicas com inchaço dos lábios, rosto, língua, garganta, com ou sem dificuldade respiratória. Neste caso, pare de usar mirabegrona e informe o seu médico imediatamente. Não deve tomar este medicamento se estiver grávida, porque os efeitos de mirabegrona sobre o feto não são conhecidos. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** O efeito de medicamentos cardiometabólicos na farmacocinética da mirabegrona e o efeito de mirabegrona sobre a farmacocinética de outros medicamentos foram examinados em estudos de doses únicas e doses múltiplas. A maioria das interações medicamentosas foram estudadas usando uma dose de 100 mg de mirabegrona administrada na forma de comprimidos orais. Os estudos de interação de mirabegrona com metoprolol e com metformina utilizaram mirabegrona de liberação imediata (IR) 160 mg. Não houve alterações clinicamente relevantes entre mirabegrona e medicamentos que incluem, induzem ou são um substrato de uma das isoformas CYP ou transportadores, exceto para a interação com metoprolol. Em estudos de interação com metoprolol, a administração concomitante de mirabegrona com metoprolol reduziu a clearance de metoprolol em cerca de 70%. Se estiver tomando metoprolol, seu médico poderá recomendar uma redução da dose de mirabegrona por vez ao dia. Deve tomar este medicamento uma vez ao dia, pela manhã com um copo de água, com ou sem alimentos. **REACAOES ADVERSAS:** Reações comuns: Infecção do trato urinário, aumento da frequência cardíaca, náusea, tontura, prisão de ventre, diarreia e dor de cabeça. **REAÇoes INCOMUNS:** Infecção da bexiga (cistite), palpitações, batimento cardíaco irregular, coceira, erupção cutânea ou urticária, infecção vaginal, indigestão, inflamação do estômago e inchaço das artérias. **Reações raras:** Inchaço da palmeira, inchaço do lábio, inchaço da face, língua ou garganta que causa dificuldade em respirar, pequenos manchas roxos na pele, inflamação dos pequenos vasos sanguíneos, uma condição que provoca o aumento da pressão dentro do globo ocular, causando a dor gradual de visão (glaucoma), distensão abdominal, inflamação do seio nasal, aumento no sangue de uma enzima chamada LDH, doença causada pela formação de pedras nos rins e dor na bexiga. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - Registro 1.3517.0081**

- Medicamento Genérico, Lei nº 9.787, de 1999 - ALFA: 0800 772 7172 | alfa@althia.com.br | www.althia.com.br