



PORTFÓLIO DE PRODUTOS



As informações deste material encontram-se de forma reduzida. A bula completa de cada medicamento está disponível em nosso site:


www.pratidonaduzzi.com.br/produtos

O USO DESTE MATERIAL É RESTRITO À FORÇA DE VENDAS PRATI-DONADUZZI.

O CONTEÚDO É DE CARÁTER INFORMATIVO, NÃO AUTORIZADO À PROPAGANDA DE PRODUTOS.



Atualizado em 2024





Uma empresa que faz
a diferença na vida dos
BRASILEIROS!

Oferecer saúde e bem-estar às pessoas nos inspira a buscar cada vez mais INOVAÇÃO.

É ela que nos move a produzir medicamentos de alta qualidade e confiabilidade.

Em cada dose dispensada entregamos mais que um medicamento, entregamos cuidado e atenção ao consumidor.

A Prati-Donaduzzi está presente em mais de 65 mil* farmácias em todo o território nacional.

Desejamos que esta união continue transformando a vida de milhões de brasileiros, para que com saúde possam realizar seus sonhos.

*Fonte: IQVIA - BASE ED, 2º Sem/2023



 **prati**
donaduzzi

● Linha do Tempo

1993

INÍCIO DA NOSSA
HISTÓRIA



2005

TRANSPORTADORA
PRATI-DONADUZZI
E CENTRALPACK



2011

ABERTURA DA
PRIMEIRA FILIAL
DE DISTRIBUIÇÃO



2013

SPECIALITÀ
FINE CHEMICALS



2015

NUTRACÊUTICOS
LINHA VIGORA



2016

INAUGURAÇÃO
PLANTA
SÓLIDOS III



2018

NUTRACÊUTICOS: EXPORTAÇÃO
DO 1º CONTÊINER DA LINHA
NORTE AMERICANA



2020

LINHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA
COM FOCO EM SNC



2023

INAUGURAÇÃO
PLANTA
SÓLIDOS IV



PRESCRIÇÃO MÉDICA

Em 2019 a Prati-Donaduzzi ingressou na área de Prescrição Médica com medicamentos voltados para o Sistema Nervoso Central (SNC) e indicados para tratar doenças como: epilepsia, Alzheimer, ansiedade, depressão, dor neuropática, esquizofrenia, autismo, bipolaridade e insônia. Já são mais de 10 medicamentos compondo o portfólio de produtos.

O Canabidiol Prati-Donaduzzi é o primeiro produto brasileiro à base de Cannabis autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

O produto é produzido a partir do princípio ativo puro, ou seja, contendo somente o Canabidiol, sem nenhuma outra substância da Cannabis, já que a grande maioria delas não tem estudos científicos que comprovem sua atividade e segurança. O produto é livre de THC (tetrahydrocannabinol) – composto psicoativo.

A Prati-Donaduzzi possui em comercialização três apresentações, sendo nas concentrações de 20 mg/ml, 50 mg/ml e 200 mg/ml. Os produtos são apresentados ao consumidor em forma de solução oral em frascos com 30ml. As diferentes concentrações ampliam a acessibilidade ao tratamento para diferentes patologias.



SUMÁRIO

SUPLEMENTOS5

Vigora Plus de A a Z	6
Vigora Plus Mulher	8
Vigora Plus Gold	8
Vigora Plus Homem	10
Vigora Plus Visão	12
Vigora Plus Sênior	14
Vigora Plus Cálcio + D ₃	16
Vigora Plus Cálcio + D ₃ Homem	16
Vigora Plus Cálcio + D ₃ Mulher	16
Vigora Plus Colágeno	18
Vigora Plus Vitamina E	20
Vigora Plus Vitamina D	20
Vigora Plus Melatonina	22
Vigora Plus Óleo de Coco	24
Vigora Plus Ômega 3	24
Sensilatte	26

MIPs28

Acetilcisteína	30
Carbocisteína	32
Cloridrato de Ambroxol	34
Desloratadina	36
Dexprotenol	38
Digeflex	40
Dipirona Monodratada	42
Duxidina	44
Hematofer	46
Ibuprofeno 400mg	48
Loratadina	50
Maleato de Dexclorfeniramina	50
Nistatina + Óxido de Zinco	52
Nitrato de Miconazol	54
Nitrato de Oxiconazol	56
Paracetamol - Comprimido e Comp. Rev.	58
Paracetamol - Solução Oral	60
Permetrina	62
Pratiderm	64
Simeticona	66
Sulfato de Neomicina	68
Sulfato de Neomicina + Bacitracina Zíncica	70

RX72

Acetato de Dexametasona	74
Aciclovir	76
Albendazol - Comprimido Mastigável	78
Albendazol - Suspensão Oral	80
Alopurinol	82
Amoxicilina - Cápsula Dura	84
Amoxicilina - Pó para Suspensão	86
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	87
Ampicilina	88
Aripiprazol	90
Atenolol	92
Aurom	94
Azitromicina Di-Hidratada - Comprimido Rev.	96
Azitromicina Di-Hidratada - Pó para Susp.	98
Benzoilmetronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônio	100
Besilato de Anlodipino	102
Brometo de Ipratrópio	104
Bromidrato de Citalopram	106
Bromidrato de Galantamina	108
Bromoprida	110
Cabergolina	112
Captopril	114
Carvedilol	116
Cetoconazol	118
Citrato de Sildenafil	120
Clonazepam	122
Cloridrato de Bupropiona	124
Cloridrato de Clonazepam	126
Cloridrato de Ciprofloxacina	128
Cloridrato de Fluoxetina	130
Cloridrato de Memantina	132

Cloridrato de Metformina - Comprimido Rev.	134
Cloridrato de Metformina - Comprimido L. P.	136
Cloridrato de Moxifloxacina	138
Cloridrato de Ondansetrona	140
Cloridrato de Paroxetina	142
Cloridrato de Prometazina	144
Cloridrato de Propafenona	146
Cloridrato de Sertralina	148
Cloridrato de Terbinafina	150
Cloridrato de Tetraciclina	152
Cloridrato de Tramadol	154
Diclofenaco Sódico	156
Dicloridrato de Betaistina	158
Dicloridrato de Pramipexol	160
Digoxina	162
Dvitta	164
Finasterida	166
Fluconazol	168
Fosfato Sódico de Prednisolona - Sol. Oral 1mg/ml ...	170
Fosfato Sódico de Prednisolona - Sol. Oral 3mg/ml ...	172
Fumarato de Cetotifeno	174
Furosemda	176
Gabapentina	178
Ginkgo Vital	180
Glimepirida	182
Glibenclamida	182
Hidroclorotiazida	184
Ibuprofeno 600mg	186
Indapamida	188
Ivermectina	190
Lamotrigina	192
Lansoprazol	194
Levofloxacina	196
Losartana Potássica	198
Losartana Potássica + Hidroclorotiazida	200
Maleato de Dexclorfeniramina + Betametasona ...	202
Meloxicam	204
Mesalazina	206
Mesilato de Doxazosina	208
Metildopa	210
Metronidazol + Nistatina	212
Metronidazol	212
Mirtazapina	214
Mupirocina	216
Nervamin	218
Nimesulida	220
Nistatina	222
Nitrato de Miconazol	224
Olanzapina	226
Orlistate	228
Oxalato de Escitalopram	230
Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado	232
Pratiprazol	234
Prednisolona	236
Prednisona	238
Propionato de Clobetasol	240
Risperidona	242
Rivaroxabana	244
Sulfametoxazol + Trimetoprima	246
Sulfato de Salbutamol	248
Sulph	250
Tadalafila	252
Tartarato de Metoprolol	254
Tioconazol + Tinidazol	256
Triancinolona Acetonida	258
Valproato de Sódio - Xarope	260
Valproato de Sódio - Comprimido Revestido	262

LINHA SNC264

Canabidiol Prati-Donaduzzi	266
Elatium	268
Gapem	270
Harip	272
Lavie	274
Maizher	276
Nypram	278
Onaz	280
Perlid	282
Ralzin	284
Zapsy	282

SUPLEMENTOS ALIMENTARES



SUPLEMENTOS ALIMENTARES

O Plus para sua vida!

Suplementos alimentares são categorizados como alimentos que têm a finalidade de complementar os nutrientes presentes na dieta diária de uma pessoa saudável, em casos onde sua ingestão através da alimentação, seja insuficiente ou quando a dieta requer uma suplementação adicional.

Suplementos alimentares não podem substituir os alimentos, nem serem considerados como dieta exclusiva.

Por serem considerados alimentos, não necessitam de prescrição para serem dispensados.

Os suplementos alimentares podem ser dispostos ao alcance dos clientes, fora do balcão das farmácias e drogarias.

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

de **AZ**



Cód.: 17807



Próximo ao tamanho
real da cápsula



Fórmulas
balanceadas



Garantia
de qualidade



Cápsula
gelatinosa mole



Sem lactose



Não engorda

Vigora
Plus

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

de
AZ
a

Todas as vitaminas testadas e garantidas!

A fórmula de Vigora Plus A a Z possui vitaminas e minerais que complementam a alimentação e ajudam a aproveitar melhor a energia dos alimentos consumidos.

Vitaminas B12, C e Ferro

Auxiliam no funcionamento do sistema imune.

Vitaminas B2, B5, B6 e Cálcio

Auxiliam no metabolismo energético.

Vitamina D e Magnésio

Auxiliam no funcionamento muscular.

Zinco

Contribui para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas.

Vitaminas A e B2

Auxiliam na visão e metabolismo do ferro.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 30 porções
Porção 2,26 g (2 cápsulas)

	2,26 g	%VD*
Valor energético (kcal)	10	0
Gorduras totais (g)	0,8	1
Gorduras saturadas (g)	0,2	1

Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, colesterol, fibras alimentares e sódio.

MINERAIS. Por 2,26 g, %VD*: Cálcio 250 mg, 25% • Cobre 450 µg, 50% • Cromo 16 µg, 46% • Ferro 7 mg, 50% • Iodo 32 µg, 21% • Magnésio 65 mg, 15% • Manganês 1,5 mg, 50% • Molibdênio 22 µg, 49% • Selênio 17 µg, 28% • Zinco 3,5 mg, 32%.

VITAMINAS. Por 2,26 g, %VD*: Vitamina A 400 µg, 50% • Vitamina D 5 µg, 33% • Vitamina E 10 mg, 67% • Vitamina K 65 µg, 54% • Vitamina C 14 mg, 14% • Vitamina B1 0,3 mg, 25% • Vitamina B2 0,33 mg, 27% • Vitamina B3 4 mg, 27% • Vitamina B5 1,3 mg, 26% • Vitamina B6 0,33 mg, 25% • Vitamina B7 7,5 µg, 25% • Vitamina B9 100 µg, 25% • Vitamina B12 2,4 µg, 100%.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

• Cápsulas gelatinosas • Rápida absorção • Aroma artificial de baunilha

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

Mulher



Próximo ao tamanho
real da cápsula



Cód.: 17809

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

Gold



Próximo ao tamanho
real da cápsula



Cód.: 19202



Fórmulas
balanceadas



Garantia
de qualidade



Cápsula
gelatinosa mole



Sem lactose



Não engorda

Vigora
Plus

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES



A fórmula de Vigora Plus Mulher contém doses equilibradas de vitaminas A e E, que fortalecem o sistema imunológico e auxiliam no funcionamento normal da visão. A biotina ajuda a manter a saúde da pele, das unhas e dos cabelos.

Zinco	Vitamina C	Cálcio	Vitamina B9	Vitamina E e Manganês
Contribui para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas.	Auxilia na formação do colágeno e no funcionamento do sistema imune.	Auxilia no metabolismo energético e no funcionamento muscular.	Fonte de ácido fólico e auxilia na formação das células vermelhas do sangue.	São antioxidantes que auxiliam na proteção dos danos causados pelos radicais livres.

- Cápsulas moles • Rápida absorção
- Aroma artificial de baunilha

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 30 porções
Porção 2,26 g (2 cápsulas)

	2,26 g	%VD*
Valor energético (kcal)	10	0
Gorduras totais (g)	0,8	1
Gorduras saturadas (g)	0,2	1

Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, colesterol, fibras alimentares e sódio.

MINERAIS. Por 2,26 g, %VD*: Cálcio 250 mg, 25% • Ferro 10 mg, 71% • Magnésio 65 mg, 15% • Manganês 1,7 mg, 55% • Zinco 2,0 mg, 18%.

VITAMINAS. Por 2,26 g, %VD*: Vitamina A 400 µg, 50% • Vitamina D 5 µg, 33% • Vitamina E 10 mg, 67% • Vitamina K 25 µg, 21% • Vitamina C 45 mg, 45% • Vitamina B1 1,2 mg, 100% • Vitamina B2 1,3 mg, 108% • Vitamina B3 13 mg, 87% • Vitamina B5 5,0 mg, 100% • Vitamina B6 0,5 mg, 38% • Vitamina B7 30 µg, 100% • Vitamina B9 400 µg, 100% • Vitamina B12 2,4 µg, 100%.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES



A fórmula de Vigora Gold possui vitaminas e minerais que auxiliam na proteção dos danos causados pelos radicais livres e contribuem na manutenção da pele, cabelos e unhas.

Vitamina A	Biotina	Vitamina C	Vitamina B6	Zinco
Contribui na manutenção da pele, auxilia na visão e no metabolismo do ferro.	Contribui na manutenção do cabelo e da pele e auxilia no metabolismo energético.	Auxilia no funcionamento do sistema imune e na formação de colágeno.	Auxilia na formação de células vermelhas do sangue e na síntese de cisteína.	Auxilia na manutenção de ossos e na síntese de proteínas.

- Cápsulas moles • Rápida absorção
- Aroma artificial de baunilha

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 60 porções
Porção 1,10 g (1 cápsulas)

	1,10 g	%VD*
Valor energético (kcal)	6	0

Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol, fibras alimentares e sódio.

MINERAIS. Por 1,10 g, %VD*: Ferro 7 mg, 50% • Magnésio 65 mg, 15% • Zinco 3,5 mg, 32%.

VITAMINAS. Por 1,10 g, %VD*: Vitamina A 600 µg, 75% • Vitamina E 3,3 mg, 22% • Vitamina C 45 mg, 45% • Vitamina B1 1,2 mg, 100% • Vitamina B2 1,3 mg, 108% • Vitamina B3 16 mg, 107% • Vitamina B5 5 mg, 100% • Vitamina B6 1,3 mg, 100% • Biotina 30 µg, 100% • Ácido fólico 144 µg, 36% • Vitamina B12 2,4 µg, 100%.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

Todas as vitaminas testadas e garantidas!

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

Homem

De A. Zinco



Cód.: 17808



Próximo ao tamanho
real da cápsula



Fórmulas
balanceadas



Garantia
de qualidade



Cápsula
gelatinosa mole



Sem lactose



Não engorda

Vigora
Plus

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

Homem

De A a Zinco

Todas as vitaminas testadas e garantidas!

A fórmula de Vigora Plus Homem contém doses ajustadas de cálcio, magnésio e vitaminas D e B6, que ajudam a manter a saúde dos músculos.

Zinco e Cobre

Auxiliam no funcionamento do sistema imune.

**Vitamina D
Cálcio e Magnésio**

Auxiliam no funcionamento muscular.

**Vitaminas
B1, B2, B5,
B6, B7 e B12**

Auxiliam no metabolismo energético.

**Vitaminas
C, E, B2,
Selênio e Manganês**

São antioxidantes que auxiliam na proteção dos danos causados pelos radicais livres.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 30 porções

Porção 2,26 g (2 cápsulas)

	2,26 g	%VD*
Valor energético (kcal)	10	0
Gorduras totais (g)	0,8	1
Gorduras saturadas (g)	0,1	1

Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, colesterol, fibras alimentares e sódio.

MINERAIS. Por 2,26 g, %VD*: Cálcio **250 mg**, 25% • Cobre **450 µg**, 50% • Cromo **18 µg**, 51% • Ferro **3,5 mg**, 25% • Iodo **65 µg**, 43% • Magnésio **65 mg**, 15% • Manganês **1,7 mg**, 57% • Molibdênio **22 µg**, 49% • Selênio **17 µg**, 28% • Zinco **2 mg**, 18%.

VITAMINAS. Por 2,26 g, %VD*: Vitamina A **500 µg**, 63% • Vitamina D **5 µg**, 33% • Vitamina E **10 mg**, 67% • Vitamina K **30 µg**, 25% • Vitamina C **45 mg**, 45% • Vitamina B1 **1,2 mg**, 100% • Vitamina B2 **1,3 mg**, 108% • Vitamina B5 **1,3 mg**, 26% • Vitamina B6 **1,3 mg**, 100% • Vitamina B7 **8 µg**, 27% • Vitamina B9 **400 µg**, 100% • Vitamina B12 **2,4 µg**, 100%.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

• Cápsulas gelatinosas • Rápida absorção • Aroma artificial de baunilha

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

Visão



Cód.: 22963



Próximo ao tamanho
real da cápsula



Fórmulas
balanceadas



Garantia
de qualidade



Cápsula
gelatinosa mole



Sem lactose



Não engorda

Vigora

Plus



Todas as vitaminas testadas e garantidas!

A fórmula de Vigora Plus Visão contém doses equilibradas de vitaminas Zinco, Cobre, C e E, que fortalecem o sistema imunológico e auxiliam no funcionamento normal da visão.

Zinco

O Zinco auxilia na visão, no processo de divisão celular e no metabolismo da vitamina A.

Cobre

O Cobre auxilia no funcionamento do sistema imune, no metabolismo energético e no transporte de ferro no organismo.

Vitamina C

A vitamina C auxilia na absorção de ferro dos alimentos e no funcionamento do sistema imune.

Vitamina E

A vitamina E é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 60 porções
Porção 0,36 g (1 cápsula)

	0,36g	%VD (*)
Valor Energético (kcal)	0	0
Carboidratos totais (g)	0	0
Açúcares totais (g)	0	
Açúcares adicionados (g)	0	0
Proteínas (g)	0	0
Gorduras totais (g)	0	0
Gorduras saturadas (g)	0	0
Gorduras trans (g)	0	0
Fibra alimentar (g)	0	0
Sódio (mg)	0	0
Vitamina E (mg)	10	67
Vitamina C (mg)	45	45
Cobre (µg)	900	100
Zinco (mg)	7	64
Luteína (mg)	10	
Zeaxantina (mg)	2	

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

- Cápsulas gelatinosas
- Rápida absorção
- **ADVERTÊNCIA:** Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

sênior



Cód.: 17810



Próximo ao tamanho
real da cápsula



Fórmulas
balanceadas



Garantia
de qualidade



Cápsula
gelatinosa mole



Sem lactose



Não engorda

Vigora
Plus

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

sênior

Todas as vitaminas testadas e garantidas!

A fórmula de Vigora Plus Sênior contém doses ajustadas de vitaminas C e E, manganês e selênio que ajudam a proteger as células contra as ações dos radicais livres.

Cálcio

Auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes.

Vitaminas A, B12 e C

Auxiliam no funcionamento do sistema imune.

Vitamina D e Magnésio

Auxiliam no funcionamento muscular.

Vitaminas B5, B6, B7 e Cálcio

Auxiliam no metabolismo energético.

Vitaminas A e B2

Auxiliam na visão e no metabolismo do ferro.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 30 porções

Porção 2,26 g (2 cápsulas)

	2,26 g	%VD*
Valor energético (kcal)	10	0
Gorduras totais (g)	0,8	1
Gorduras saturadas (g)	0,2	1

Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, colesterol, fibras alimentares e sódio.

MINERAIS. Por 2,26 g, %VD*: Cálcio 250 mg, 25% • Cobre 450 µg, 50% • Cromo 18 µg, 51% • Ferro 3,5 mg, 25% • Iodo 65 µg, 43% • Magnésio 65 mg, 15% • Manganês 1,7 mg, 55% • Molibdênio 22 µg, 49% • Selênio 17 µg, 28% • Zinco 2,0 mg, 18%.

VITAMINAS. Por 2,26 g, %VD*: Vitamina A 600 µg 75% • Vitamina D 5 µg, 33% • Vitamina E 10 mg, 67% • Vitamina K 65 µg, 54% • Vitamina C 45 mg, 45% • Vitamina B1 1,2 mg, 100% • Vitamina B2 1,3 mg, 108% • Vitamina B5 1,3 mg, 26% • Vitamina B6 1,3 mg, 100% • Vitamina B7 30 µg, 100% • Vitamina B9 100 µg, 25% • Vitamina B12 2,4 µg, 100%.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES

CÁLCIO+D₃

vitamina

Original, Homem e Mulher



Próximo ao tamanho
real da cápsula
Cód.: 16360



Próximo ao tamanho
real da cápsula
Cód.: 16366



Próximo ao tamanho
real da cápsula
Cód.: 16358



Fórmulas
balanceadas



Garantia
de qualidade



Cápsula
gelatinosa mole



Sem lactose



Não engorda

Vigora
Plus

SUPLEMENTO

ALIMENTAR EM CÁPSULAS MOLES



Todas as vitaminas testadas e garantidas!

A fórmula do Vigora Plus Cálcio+Vitamina D3, além das doses ajustadas de cálcio e vitamina D3, foi enriquecida com vitamina C que atua na síntese do colágeno responsável pela estruturação da pele e ação contra os radicais livres, além da vitamina A que auxilia na manutenção da visão e do zinco que fortalece o sistema imunológico.

Cálcio

Auxilia na coagulação do sangue, no funcionamento muscular, no metabolismo energético, no funcionamento neuromuscular e na formação e manutenção de ossos e dentes.

vitamina C

É um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres, no metabolismo de proteínas e gorduras, na absorção de ferro dos alimentos e na formação do colágeno.

vitamina D3

Auxilia na absorção de cálcio e fósforo, no funcionamento do sistema imune, na manutenção de níveis de cálcio no sangue, no processo de divisão celular e no funcionamento muscular.

Zinco

Auxilia na síntese de proteínas, no processo de divisão celular, na manutenção de ossos, na visão, no funcionamento do sistema imune e contribui para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas.

Ácido Fólico

O Ácido Fólico auxilia na síntese de aminoácidos, no processo de divisão celular, no funcionamento do sistema imune, no metabolismo da homocisteína e na formação de células vermelhas do sangue.

vitamina A

Auxilia na visão, no funcionamento do sistema imune, no metabolismo do ferro, na manutenção de mucosas, no processo de diferenciação celular e contribui para a manutenção da pele.

vitamina B5

Auxilia no metabolismo energético.

CÁLCIO+D3

vitamina

CÁLCIO+D3

vitamina

Homem

CÁLCIO+D3

vitamina

Mulher

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 30 porções
Porção 2,25 g (2 cápsulas)

	2,25 g	%VD*
Valor energético (kcal)	8	0
Carboidratos (g)	0	0
Apúcares totais (g)	0	0
Apúcares adicionados (g)	0	0
Proteínas (g)	0	0
Gorduras totais (g)	0,7	1
Gorduras saturadas (g)	0,1	1
Gorduras trans (g)	0	0
Colesterol (mg)	0	0
Fibras alimentares (g)	0	0
Sódio (mg)	0	0
Vitamina D (µg)	5	33
Cálcio (mg)	400	40

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 30 porções
Porção 2,39 g (2 cápsulas)

	2,39 g	%VD*
Valor energético (kcal)	9	0
Carboidratos (g)	0	0
Apúcares totais (g)	0	0
Apúcares adicionados (g)	0	0
Proteínas (g)	0	0
Gorduras totais (g)	0,7	1
Gorduras saturadas (g)	0,1	1
Gorduras trans (g)	0	0
Colesterol (mg)	0	0
Fibras alimentares (g)	0	0
Sódio (mg)	0	0
Vitamina A (µg)	600	75
Vitamina C (mg)	5	33
Vitamina D (µg)	5	33
Vitamina B5 (mg)	45	45
Vitamina B9 (µg)	5	100
Cálcio (mg)	400	40
Zinco (mg)	7	64

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 30 porções
Porção 2,67 g (2 cápsulas)

	2,67 g	%VD*
Valor energético (kcal)	9	0
Carboidratos (g)	0	0
Apúcares totais (g)	0	0
Apúcares adicionados (g)	0	0
Proteínas (g)	0	0
Gorduras totais (g)	0,8	1
Gorduras saturadas (g)	0,1	1
Gorduras trans (g)	0	0
Colesterol (mg)	0	0
Fibras alimentares (g)	0	0
Sódio (mg)	0	0
Vitamina D (µg)	5	33
Vitamina C (mg)	45	45
Vitamina B5 (mg)	5	100
Vitamina B9 (µg)	144	36
Cálcio (mg)	500	50
Zinco (mg)	7	64

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

• Cápsulas gelatinosas • Rápida absorção • Aroma artificial de baunilha

Colágeno

Tipo II

COLÁGENO DE FRANGO COM COLÁGENO
TIPO II NÃO DESNATURADO (UC-II)

SUPLEMENTO ALIMENTAR
EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS

40 mg



Código: 21143



Código: 21144



Fórmulas
balanceadas



Garantia
de qualidade



Comprimido
revestido




Sem lactose



Não engorda

Vigora
Plus

COLÁGENO



O colágeno tipo II não desnaturado auxilia na manutenção da função articular

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 0,18 g (1 comprimido revestido)

Quantidade por porção	%VD (*)
Colágeno	40 mg -

"Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras *trans*, fibra alimentar e sódio."

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Produto isento de registro de acordo com a Resolução RDC nº 27/2010.

Vitamina E



Cód.: 16947



Próximo ao tamanho real da cápsula

Vitamina D



21082



21083

2.000 UI



1.000 UI



Fórmulas balanceadas



Garantia de qualidade



Cápsula gelatinosa mole



Sem lactose



Não engorda

Vigora
Plus

Vitamina E



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 60 porções
Porção 0,26 g (1 cápsulas)

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol, fibras alimentares e sódio.

VITAMINAS. Por 026 g, %VD*: • Vit E 10mg, 67%.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.



A VITAMINA E PREVENE A OXIDAÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS POLINSATURADOS E ATUA CONTRA OS RADICAIS LIVRES.



A VITAMINA E É O PRINCIPAL ANTIOXIDANTE BIOLÓGICO DO ORGANISMO E COMBATE ÀS ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO.



MINI CÁPSULA GELATINOSA FÁCIL DE ENGOLIR.



A VITAMINA E AUXILIA NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNE.

Vitamina D

1.000 UI

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 60 porções
Porção 0,27 g (1 cápsulas)

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol, fibras alimentares e sódio.

VITAMINAS. Por 027 g, %VD*: • Vit D 25 µg, 167%.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

Vitamina D

2.000 UI

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 60 porções
Porção 0,27 g (1 cápsulas)

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol, fibras alimentares e sódio.

VITAMINAS. Por 0,27 g, %VD*: • Vit D 50 µg, 333%.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.



A VITAMINA D AUXILIA NA ABSORÇÃO DE CÁLCIO E FÓSFORO.



A VITAMINA D AUXILIA NA FORMAÇÃO DE OSSOS E DENTES.




MINI CÁPSULA GELATINOSA FÁCIL DE ENGOLIR.



A VITAMINA D AUXILIA NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNE.

Melatonina

Auxilia no ciclo
vigília-sono



Contém **90** cápsulas moles

Código do produto: 22217



Código do produto: 22443




Agora a **apresentação em gota** também está disponível

Vigora
Plus

Melatonina

maior biodisponibilidade, mesmo com uma dosagem baixa de melatonina¹



Código do produto: 22443



Código do produto: 22217



Garantia de qualidade
100% testado em controle de qualidade



Fórmula isenta de açúcar



Não contém glúten

óleo de COCO


em cápsula



Cód.: 18227
Reg. MS.: 6.7323.002.001-0



ômega 3 | Óleo de peixe em cápsula



Cód.: 18510



Cód.: 18230



Cód.: 18229



Reg. MS.: 6.7323.0003.001-6

Vigora
NATURE

óleo de COCO

em cápsula



1000 MG DE ÓLEO DE
COCO VIRGEM EM CÁPSULA



NÃO CONTÉM GLÚTEN



CÁPSULA
GELATINOSA MOLE

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 12 porções
Porção 7,40 g (5 cápsulas)

	7,4 g	%VD*
Valor energético (kcal)	54	3
Proteínas (g)	1,5	3
Gorduras totais (g)	5,2	8
Gorduras saturadas (g)	4,2	21
Lípidios totais(g)	5,2	

Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras trans, colesterol, fibras alimentares e sódio.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.



60 cápsulas
moles

Cód.: 18510

90 cápsulas
moles

Cód.: 18230

120 cápsulas
moles

Cód.: 18229

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 22,5 porções
Porção 6,16 g (4 cápsulas)

	6,16 g	%VD*
Valor energético (kcal)	53	3
Carboidratos (g)	0,5	0
Gorduras totais (g)	5,6	9
Gorduras saturadas (g)	2,2	11
Gorduras moninsaturadas (g)	0,8	4
Gorduras poli-insaturadas (g)	2,6	13
Ômega 3 (mg)	1200	30
Ácido linolênico (mg)	101	
Ácido eicosapentaenoico (mg)	640	
Ácido docosaexaenoico (mg)	400	
Colesterol (mg)	37	12

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

O consumo de ácidos graxos ômega 3 auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.¹



O CONSUMO DE ÁCIDOS GRAXOS
ÔMEGA 3, AUXILIA NA MANUTENÇÃO
DE NÍVEIS SAUDÁVEIS DE TRIGLICERÍDEOS*



1000 MG DE ÓLEO
DE PEIXE EM CÁPSULA



NÃO CONTÉM GLÚTEN



CÁPSULA
GELATINOSA MOLE



CONTÉM 640 mg DE EPA E
400 mg DE DHA POR PORÇÃO**

* Desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

** Porção de 4 cápsulas.

Referência:

1- ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alimentos Com Alegações de Propriedades Funcionais e ou de Saúde. Brasília. Atualizado em: 22/12/2016. Disponível em: < <http://portal.anvisa.gov.br/alimentos/alegacoes>.

Sensi latte

Consumir enzima lactase ficou descomplicado!



*Solicitação de Registro de Patente | PCT/BR2017/050300

- Lactase em comprimido;
- Não necessita de água para ingestão;
- Não contém açúcar e nem glúten;
- Acompanha folheto explicativo;
- Sabor neutro ou de baunilha*;
- Isento de prescrição médica;
- Formato do comprimido diferenciado para dissolver facilmente na boca.

* Aroma artificial.



Sensi latte

COMO USAR:

Consuma um comprimido de Sensilatte, deixe dissolver na boca ou tome com água, no instante em que ingerir alimentos que contenham lactose ou conforme orientação do médico ou nutricionista.

RESTRIÇÕES:

Não deve ser consumido por diabéticos e indivíduos com glicosemia. Consumir sob orientação do médico ou nutricionista.



Display

25 envelopes
6 Comprimidos

- **SEM SABOR**

Cód: 19167 / 1x6

- **BAUNILHA**

Cód: 19165 / 1x6



Caixa

30 Comprimidos

- **SEM SABOR**

Cód: 18231 / 5x6

- **BAUNILHA**

Cód: 17795 / 5x6



**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**

APRESENTAÇÕES:

Display com 25 envelopes contendo 6 comprimidos cada e caixa com 30 comprimidos nas opções sem sabor e com sabor artificial de baunilha. Ambas com 9.000 FCC de enzima lactase.

*1 unidade FCC é definida como a quantidade da enzima que libera o-nitrofenol a uma taxa de 1mol/min, sob as condições estabelecidas pelo Food Chemicals Codex (FCC).

 @sensilatte

www.pratidonaduzzi.com.br

MEDICAMENTOS | MIPs

ISENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA



Uma empresa que faz
a diferença na vida dos
BRASILEIROS!

MIPs

MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA

São medicamentos que não precisam de prescrição ou receita médica, considerados seguros em relação às contraindicações e efeitos colaterais. De forma geral, são utilizados para o tratamento de sintomas ou males menores, como dores em geral, azia, má digestão, entre outros. Estes medicamentos podem ser dispostos ao alcance dos clientes, fora do balcão das farmácias e drogarias.

São regulados pela Portaria 138 de 29 de Maio de 2003, republicada em 06 de Janeiro de 2004 e, segundo a Resolução 586 de 29 de Agosto de 2013, o **farmacêutico** também pode realizar a prescrição deles.

Acetilcisteína

Granulado

G Medicamento
Genérico



ATENÇÃO
CONTÉM AÇÚCAR



Sabor
Laranja



Cód.: 187 / 100 mg/5g

Cód.: 123 / 200 mg/5g

Cód.: 5012 / 600 mg/5g

REFERÊNCIA

Acetilcisteína 100 mg/5g: Acetilcisteína Genérico / Eurofarma Laboratórios S.A.

Acetilcisteína 200 mg/5 e 600 mg/5g: Fluimucil / Zambon Laboratórios Farmacêuticos Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Expectorantes balsâmicos e mucolíticos

Acetilcisteína

Granulado


**CLASSE TERAPÊUTICA – EXPECTORANTES
BALSÂMICOS E MUCOLÍTICOS**

USO ORAL

**USO PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS: GRANULADO DE
100 MG/5 G**

**USO ADULTO: GRANULADO DE 200 MG/5 G E
GRANULADO DE 600 MG/5 G**

SABOR: LARANJA



PARA QUE ACETILCISTEÍNA É INDICADO?

Este é um medicamento expectorante indicado quando se tem dificuldade para expectorar e há muita secreção densa e viscosa, tais como: bronquite aguda, bronquite crônica e suas exacerbações (piora do quadro clínico e complicações), enfisema pulmonar (doença crônica caracterizada pelo comprometimento dos pulmões), pneumonia (inflamação nos pulmões e brônquios), colapso/atelectasias pulmonares (fechamento dos brônquios), mucoviscidose (doença hereditária que produz muco espesso, também conhecida por fibrose cística). Também é indicado para intoxicação acidental ou voluntária por paracetamol.

COMO ACETILCISTEÍNA FUNCIONA?

A acetilcisteína é um medicamento expectorante que ajuda a eliminar as secreções produzidas nos pulmões, facilitando a respiração. A acetilcisteína modifica as características da secreção respiratória (muco) reduzindo sua consistência e elasticidade, tornando-a mais fluida ou mais liquefeita, o que facilita a sua eliminação das vias respiratórias. A acetilcisteína funciona ainda como antídoto de danos hepáticos provocados pelo paracetamol, regenerando os estoques de uma substância vital para a função normal do fígado (a glutatona).

APRESENTAÇÕES

100 mg/5 g granulado
Reg. MS 1.2568.0127.004-2
Cód.: 187

200 mg/5 g granulado
Reg. MS 1.2568.0127.001-8
Cód.: 123

600 mg/5g granulado
Reg. MS 1.2568.0127.007-7
Cód.: 5012

**Acesse a bula
do produto:**



Carbocisteína

Xarope

G Medicamento
Genérico

**NÃO CONTÉM
AÇÚCAR**

**Acompanha
Copo Medida**

**Sabor
Framboesa**

**Sabor
Canela**



Cód.: 148 / 100ml

Cód.: 150 / 100ml

REFERÊNCIA

MUCOLITIC / Nycomed Pharma Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Expectorantes balsâmicos e mucolíticos

Carbocisteína

Xarope

**CLASSE TERAPÊUTICA – EXPECTORANTES
BALSÂMICOS E MUCOLÍTICO**

USO ORAL

USO ADULTO (50MG/ML)

USO PEDIÁTRICO (20MG/ML)




PARA QUE CARBOCISTEÍNA É INDICADO?

A carbocisteína é indicada em afecções agudas ou crônicas do trato respiratório, nas quais a secreção abundante e/ou viscosa do muco seja considerado agravante; além de ser indicada nos casos de bronquites agudas e crônicas, insuficiência respiratória crônica, rinites, sinusites e laringites. Tem ação fluidificante, expectorante e anti-inflamatória do epitélio brônquico e das vias aéreas superiores.

COMO CARBOCISTEÍNA FUNCIONA?

A carbocisteína diminui a viscosidade das secreções pulmonares e facilita a retirada destas pela tosse, drenagem postural ou meio mecânico. É utilizada como fluidificante, expectorante e mucolítico. Após a administração, atinge o efeito máximo em 1 a 2 horas.



APRESENTAÇÕES

20 mg/ml xarope pediátrico 100 ml
Reg. MS 1.2568.0034.005-5
Cód.: 148

20 mg/ml xarope adulto 100 ml
Reg. MS 1.2568.0034.007-1
Cód.: 150

**Acesse a bula
do produto:**



Cloridrato de Ambroxol

G Medicamento Genérico

Solução Gotas, Xarope Adulto e Xarope Pediátrico

LANÇAMENTO



Cód.: 25/ 50 ml

Cód.: 114/ 120 ml

Cód.: 111/ 120 ml

**NOVA
EMBALAGEM**

REFERÊNCIA


Mucosolvan – Sanofi Medley Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Expectorantes.

Cloridrato de Ambroxol

Solução Gotas



CLASSE TERAPÊUTICA – ANALGÉSICO NARCÓTICO

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE O CLORIDRATO DE AMBROXOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento das doenças broncopulmonares (brônquios e pulmões) agudas e crônicas para facilitar a expectoração (soltar o catarro do peito) quando houver acúmulo de secreção.

COMO O CLORIDRATO DE AMBROXOL FUNCIONA? Este medicamento favorece a expectoração, ou seja, ajuda na eliminação do catarro das vias respiratórias, alivia a tosse, desobstrui os brônquios e, devido ao leve efeito anestésico local, alivia a irritação da garganta associada à tosse com catarro. O início de ação ocorre em até 2 horas após o uso.

Xarope Adulto e Pediátrico

CLASSE TERAPÊUTICA – ANALGÉSICO NARCÓTICO

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE O CLORIDRATO DE AMBROXOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento das doenças broncopulmonares (brônquios e pulmões) agudas e crônicas para facilitar a expectoração (soltar o catarro do peito) quando houver acúmulo de secreção.

COMO O CLORIDRATO DE AMBROXOL FUNCIONA? Este medicamento favorece a expectoração, ou seja, ajuda na eliminação do catarro das vias respiratórias, alivia a tosse, desobstrui os brônquios e, devido ao leve efeito anestésico local, alivia a irritação da garganta associada à tosse com catarro. O início de ação ocorre em até 2 horas após o uso.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÃO

7,5 mg/ml solução gotas
Reg. MS 1.2568.0038.001-4
Cód.: 25

15mg/5ml Xarope Adulto
Reg. MS 1.2568.0039.008-7
Cód.: 114

30mg/5ml Xarope Pediátrico
Reg. MS 1.2568.0039.010-9
Cód.: 111

Desloratadina

Xarope

G Medicamento
Genérico

ATENÇÃO
CONTÉM AÇÚCAR

Acompanha
**Seringa
Dosadora**

**Sabor
Hortelã**



Cód.: 22274 / 100ml

Cód.: 22273 / 60ml

REFERÊNCIA
DESALEX/ /Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA
Anti-histamínicos sistêmicos

Desloratadina

Xarope

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HISTAMÍNICOS SISTÊMICOS

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES

PARA QUE DESLORATADINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o alívio dos sintomas associados à rinite alérgica, como: coriza (corrimento nasal), espirros e prurido nasal (coceira no nariz), ardor e prurido ocular (coceira nos olhos), lacrimejamento, prurido do palato (coceira no céu da boca) e tosse. Os sinais e sintomas oculares e nasais são rapidamente aliviados após a administração oral do produto. Este medicamento é também indicado para o alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras alergias da pele.



COMO DESLORATADINA FUNCIONA?

Este medicamento impede que a histamina (substância causadora da alergia) consiga agir (impede sua liberação, bloqueia sua ação no local da alergia e evita a inflamação decorrente da resposta alérgica) e assim, combate os sintomas da rinite alérgica intermitente e persistente, da urticária e de outras alergias. Este medicamento não provoca sonolência.

APRESENTAÇÕES

0,5 mg/ml xarope 100 ml + seringa dosadora

Reg. MS 1.2568.0218.002-0

Cód.: 22274

0,5 mg/ml xarope 60 ml + seringa dosadora

Reg. MS 1.2568.0218.004-7

Cód.: 22273

**Acesse a bula
do produto:**



Dexprotenol

Dexpantenol

Pomada

E Medicamento
Específico



Cód.: 16061 / 30g

INDICAÇÕES

Tratamento de dores e febre

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos com ação na pele e mucosas

Dexprotenol

Dexpantenol

Pomada

**CLASSE TERAPÊUTICA – OUTROS PRODUTOS
COM AÇÃO NA PELE E MUCOSAS**

**USO TÓPICO (USO EXTERNO)
USO ADULTO E PEDIÁTRICO**




PARA QUE DEXPROTENOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para prevenção e tratamento da dermatite de fraldas (assaduras); prevenção e tratamento das fissuras (rachaduras) de pele e mucosas (mamilos, lábios e região anal); feridas (ferimentos leves e escoriações); e escaras.

COMO DEXPROTENOL FUNCIONA?

O princípio ativo de Dexprotenol pomada dermatológica é o dexpantenol, que está incorporado em uma base oleosa (formada por lanolina, cera branca de abelha e outros óleos como o óleo de amêndoas e óleo mineral – petrolato líquido). O dexpantenol protege a pele agindo por dentro: penetra nas camadas internas da pele e é transformado em vitamina B5, que estimula a formação e regeneração natural da pele, tornando-a nutrida e fortalecida.



APRESENTAÇÃO

50 mg/g pomada x 30 g
Reg. MS 1.2568.0245.001-1
Cód.: 16061

**Acesse a bula
do produto:**



Digeflex

Hidróxido de alumínio 37 mg/mL
Hidróxido de magnésio 40 mg/mL
Simeticona 5 mg/mL
Suspensão

Medicamento
N/S Notificação
simplificada

 Sabor
Morango



Cód.: 19120/240 mL

CLASSE TERAPÊUTICA
Antiácido e Antiflatulento

Digeflex

Hidróxido de alumínio 37 mg/mL

Hidróxido de magnésio 40 mg/mL

Simeticona 5 mg/mL

Suspensão

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIÁCIDO E ANTIFLATULENTO

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

SABOR: MORANGO



PARA QUE DIGEFLEX É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento dos sintomas da acidez estomacal, azia, desconforto estomacal, dor de estômago, dispepsia (indigestão), queimação, esofagite péptica (inflamação do esôfago, causada pelo refluxo gástrico) e hérnia de hiato (quando a porção do estômago desliza para dentro do tórax, através de uma passagem naturalmente fechada do diafragma, músculo responsável pela respiração). Também é utilizado como antiflatulento (antigases) para alívio dos sintomas do excesso de gases, inclusive nos quadros pós-operatórios.

APRESENTAÇÃO

37 mg/mL + 40 mg/mL + 5 mg/mL


suspensão 240 mL

Cód.: 19120

Contraindicações: Este medicamento não deve ser utilizado nos casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula, insuficiência renal severa, hipofosfatemia, gravidez, amamentação e obstrução intestinal. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência renal severa.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Ao persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. O teor de sódio está acima de 1 mg/mL.

Medicamento de notificação simplificada RDC ANVISA nº 199/2006. AFE nº 1.02568.5



Dipirona

Monoidratada

Comprimido 1g e 500mg

G Medicamento
Genérico



Cód.: 19175/ 2x10

Cód.: 19176 / 3x10



Cód.: 27 / 50x10



Cód.: 15187/ 1x10

Cód.: 22019 / 2x10



Cód.: 21993/25x4

REFERÊNCIA

NOVALGINA /

Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda.

INDICAÇÕES

Analgésico utilizado no tratamento de dores de cabeça ou cólica.

CLASSE TERAPÊUTICA

Analgésicos não narcóticos

Dipirona Monoidratada

Comprimido 1g e 500mg

CLASSE TERAPÊUTICA – ANALGÉSICOS NÃO NARCÓTICOS

USO ORAL


USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 15 ANOS

PARA QUE DIPIRONA MONOIDRATADA É INDICADO?

Este medicamento é indicado como analgésico (medicamento para dor) e antitérmico (medicamento para febre).

COMO DIPIRONA MONOIDRATADA FUNCIONA?

É um medicamento à base de dipirona monoidratada, utilizado no tratamento da dor e febre. Os efeitos analgésico e antitérmico podem ser esperados em 30 a 60 minutos após a administração e geralmente persistem por aproximadamente 4 horas.



APRESENTAÇÕES

500 mg comprimido (2x10)
Reg. MS 1.2568.0041.030-4
Cód.: 19175

500 mg comprimido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0041.031-2
Cód.: 19176

500 mg comprimido (50x10)
Reg. MS 1.2568.0041.002-9
Cód.: 27

1 g comprimido (1x10)
Reg. MS 1.2568.0041.015-0
Cód.: 15187

1 g comprimido (2x10)
Reg. MS 1.2568.0041.014-2
Cód.: 22019

1 g comprimido (8x10)
Reg. MS 1.2568.0041.013-4
Cód.: 22390

1 g comprimido (25x4)
Reg. MS 1.2568.0041.012-6
Cód.: 21993

Acesse a bula do produto:



Duxidina

Digliconato de Clorexidina

Medicamento
N/S Notificação
simplificada



CLASSE TERAPÊUTICA
Antisséptico tópico

Duxidina

Digliconato de Clorexidina


CLASSE TERAPÊUTICA - ANTISSÉPTICO TÓPICOS

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE DUXIDINA É INDICADO?

Antisséptico para ferimentos e cortes superficiais.



APRESENTAÇÕES

10 mg/ml solução tópica 30 ml + espalhador
Cód.: 14594

10 mg/ml solução tópica 45 ml spray
Cód.: 14596

Hematofer

Sulfato ferroso

Comprimido Revestido

Medicamento
N/S Notificação
simplificada



Cód.: 18631/2x25

Hematofer

Sulfato Ferroso


Comprimido Revestido

**CLASSE TERAPÊUTICA – AUXILIAR NAS
ANEMIAS CARENCIAIS**
USO ORAL
USO ADULTO



PARA QUE HEMATOFER É INDICADO?

Este medicamento é indicado para auxiliar nas anemias carenciais.



APRESENTAÇÃO

40 mg comprimido revestido (2x25)
Cód.: 18631

Modo de usar: 1 comprimido ao dia por via oral e em jejum.

Advertências e precauções: pacientes portadores de doenças hepáticas, úlcera péptica, gástrica ou duodenal, alcoolismo, insuficiência renal, indivíduos com hipersensibilidade. Administração de ferro por períodos maiores que 6 meses deve ser evitada. A suplementação de ferro não deve ser utilizada para o tratamento de anemia hemolítica em pacientes recebendo transfusão sanguínea, em uso de ferro por via parenteral.

Reações adversas: constipação, diarreia, fezes escuras, náuseas, dor epigástrica, vômito, pirose, sangramento nas fezes, escurecimento dos dentes, irritação na garganta, urina escura e hemossiderose.

Medicamento de notificação simplificada RDC ANVISA nº 199/2006. AFE nº 1.02568.5

Ibuprofeno

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 20080/1x10

Cód.: 21519/50x10

REFERÊNCIA

DALSY / Abbott Laboratórios de Brasil Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA

Analgésicos Não Narcóticos

Ibuprofeno

Comprimido Revestido

CLASSE TERAPÊUTICA – ANALGÉSICOS NÃO NARCÓTICOS

USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 12 ANOS




PARA QUE IBUPROFENO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para redução da febre e o alívio temporário de dores leves e moderadas, tais como: dor de cabeça (enxaqueca e cefaleia vascular), dor de dente, dor muscular, dor na parte inferior das costas (ou dor lombar), dores relacionadas a problemas reumáticos não articulares e periarticulares (como capsulite, bursite, tendinite, tenossinovite, etc), dores associadas a processos inflamatórios e/ou traumáticos (como entorses e distensões) e dores associadas a gripes e resfriados.

COMO IBUPROFENO FUNCIONA?

A eficácia terapêutica do Ibuprofeno resulta da inibição da enzima cicloxigenase, levando a uma redução marcante na síntese de prostaglandinas. O início de ação ocorre cerca de 30 minutos após sua administração oral e permanece por 4 a 6 horas.



APRESENTAÇÃO

400 mg comprimido revestido (1x10)
Reg. MS 1.2568.0320.001-7
Cód.: 20080

400 mg comprimido revestido (50x10)
Reg. MS 1.2568.0320.012-2
Cód.: 21519

**Acesse a bula
do produto:**



Loratadina

Xarope



Cód.: 6698 / 100mL

G Medicamento Genérico

ATENÇÃO
CONTÉM AÇÚCAR

Acompanha
Copo Medida

Sabor
Tutti-Frutti

REFERÊNCIA

CLARITIN / Merck Sharp & Dohme

CLASSE TERAPÊUTICA

Anti-histamínicos sistêmicos

Maleato de

Dexclorfeniramina

Solução



Cód.: 18528/100 mL

G Medicamento Genérico

ATENÇÃO
CONTÉM AÇÚCAR

Acompanha
Copo Medida

Sabor
Pêssego

REFERÊNCIA

POLARAMINE /Cosmed Indústria de
Cosméticos e Medicamentos S/A

CLASSE TERAPÊUTICA

Anti-histamínicos sistêmicos

Loratadina

Xarope



SABOR: TUTTI-FRUTTI

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HISTAMÍNICOS SISTÊMICOS

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS



PARA QUE LORATADINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o alívio dos sintomas associados com a rinite alérgica, como: coceira nasal, nariz escorrendo (coriza), espirros, ardor e coceira nos olhos. Este medicamento também é indicado para o alívio dos sinais e sintomas da urticária e de outras alergias da pele.

COMO LORATADINA FUNCIONA?

Este medicamento pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como anti-histamínicos, que ajudam a reduzir os sintomas da alergia, prevenindo os efeitos da histamina, uma substância produzida pelo próprio corpo. Os sinais e sintomas oculares e nasais da rinite alérgica são rapidamente aliviados após a administração oral do produto.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÃO

1 mg/ml xarope 100 ml • Reg. MS 1.2568.0080.007-2 • Cód.: 6698

Maleato de Dexclorfeniramina


Solução



SABOR: PÊSSEGO

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HISTAMÍNICOS SISTÊMICOS

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS



PARA QUE MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica (um tipo de inflamação na pele) e eczemas alérgicos (dermatite).

COMO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA FUNCIONA?

Este medicamento é um anti-histamínico (antialérgico), por isso ajuda a reduzir os sintomas da alergia, prevenindo os efeitos da histamina, que é uma substância produzida pelo próprio organismo.

Acesse a bula do produto:



SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

APRESENTAÇÃO

0,4 mg/ml solução 100 ml • Reg. MS 1.2568.0058.007-2 • Cód.: 15828

Nistatina + Óxido de Zinco

Pomada

G Medicamento
Genérico



Cód.: 170/60g

REFERÊNCIA

DERMODEX – BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA

Antimicóticos para uso tópico

Nistatina + Óxido de Zinco

Pomada

**CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIMICÓTICOS PARA USO
TÓPICO**

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO


PARA QUE É INDICADO?

A indicação principal deste medicamento é para assaduras de bebês, principalmente relacionadas ao uso de fraldas. Além dessa indicação, este medicamento pode ser usado em crianças maiores e adultos, no tratamento de irritações na região dos órgãos genitais e das nádegas, entre os dedos, nas axilas, sob os seios ou em outras áreas da pele que sofrem atrito.

COMO FUNCIONA?

Diversos trabalhos mostram que em assaduras de bebês é comum a infecção pelo fungo conhecido como Cândida (é o mesmo fungo que aparece na boca de bebês com o nome de “sapinho” e em inúmeros corrimentos vulvovaginais). Este medicamento tem na sua fórmula duas substâncias, uma que age eliminando esse fungo e a outra que cicatriza e protege a pele por meio da formação de uma camada protetora que reduz a fricção entre a pele e as fraldas e impede o contato da pele com urina e fezes.

Geralmente as assaduras das crianças regredem após 24 a 48 horas de tratamento. Mantenha o tratamento até o total desaparecimento dos sintomas.



APRESENTAÇÃO

100.000 UI/g + 200 mg/g pomada (60g)

Reg. MS 1.2568.0140.001-9

Cód.: 170

**Acesse a bula
do produto:**



Nitrato de Miconazol

Creme Dermatológico

G Medicamento Genérico



Cód.: 5117 / 28g

REFERÊNCIA
VODOL / União Química Farmacêutica Nacional S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antimicóticos para uso tópico

Nitrato de Miconazol

Creme Vaginal

Acompanha **14** Aplicadores Ginecológicos



Cód.: 12455 / 80g

REFERÊNCIA
NITRATO DE MICONAZOL/Teuto.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antimicótico

Nitrato de Miconazol

Creme Dermatológico

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIMICÓTICOS PARA USO TÓPICO
USO TÓPICO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE NITRATO DE MICONAZOL É INDICADO?


Este medicamento é indicado no tratamento de Tinea pedis (pé de atleta), Tinea cruris (micose na região da virilha), Tinea corporis e onicomicoses (micose nas unhas) causadas pelo *Trychophyton*, *Epidermophyton* e *Microsporum*; candidíase cutânea (micose de pele), Tinea versicolor e cromofitose.

COMO NITRATO DE MICONAZOL FUNCIONA?

Este medicamento é utilizado para tratamento de diversas micoses superficiais. Geralmente, age rapidamente no prurido (coceira), sintoma que frequentemente acompanha as infecções por fungos e também age no odor desagradável provocado pelas micoses superficiais.

APRESENTAÇÃO

20 mg/g creme 28 g
Reg. MS 1.2568.0184.001-9 • Cód.: 5117



**Acesse a bula
do produto:**

Nitrato de Miconazol

Creme Vaginal

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIMICÓTICO
USO TÓPICO (INTRAVAGINAL) - USO ADULTO

PARA QUE NITRATO DE MICONAZOL É INDICADO?


Este medicamento é destinado ao tratamento de infecções na região vaginal produzidas por fungos.

COMO NITRATO DE MICONAZOL FUNCIONA?

O nitrato de miconazol, substância ativa deste medicamento é um agente antifúngico com amplo espectro de ação. A ação do medicamento e o alívio dos sintomas são observados logo após as primeiras aplicações.

APRESENTAÇÃO

20 mg/g creme 80 g + 14 aplicadores ginecológicos
Reg. Ms 1.2568.0053.004-0 • Cód.: 12455



**Acesse a bula
do produto:**



Nitrato de Oxiconazol

Solução tópica

G Medicamento Genérico



Cód.: 97 / 20ml

REFERÊNCIA
OCERAL / Bayer

CLASSE TERAPÊUTICA
Antimicrobianos para uso tópico


Nitrato de Oxiconazol

Solução Tópica

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIMICÓTICOS PARA USO TÓPICO
USO TÓPICO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE NITRATO DE OXICONAZOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de todas as formas de micose superficial da pele, inclusive do pé (frieira), tronco, couro cabeludo e área genital externa.



COMO NITRATO DE OXICONAZOL FUNCIONA?

O nitrato de oxiconazol exerce ação sobre todos os principais agentes causadores de infecções fúngicas da pele.

APRESENTAÇÃO

10 mg/ml sol top 20 ml gotas
Reg. MS 1.2568.0113.001-1
Cód.: 97

**Acesse a bula
do produto:**



Paracetamol

Comprimido Revestido 750mg
e Comprimido 500mg

**NOVA
EMBALAGEM**



Cód.: 23768 / 2x10

Cód.: 23770 / 25X12



Cód.: 23757 / 2x10

Cód.: 23758 / 36X10

COMPRIMIDO

REFERÊNCIA

TYLENOL / Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Analgésicos não narcóticos


Paracetamol

Comprimido Revestido 750mg e Comprimido 500mg

CLASSE TERAPÊUTICA – ANALGÉSICOS NÃO NARCÓTICOS
USO ORAL – USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

PARA QUE PARACETAMOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais.



COMO PARACETAMOL FUNCIONA?

Este medicamento reduz a febre atuando no centro regulador da temperatura no Sistema Nervoso Central (SNC) e diminui a sensibilidade para a dor. Seu efeito tem início 15 a 30 minutos após a administração oral e permanece por um período de 4 a 6 horas.

APRESENTAÇÕES

COMPRIMIDO

- 500 mg c/ 20 comprimidos (2x10) • Reg. MS 1.2568.0050.001-1 • Cód.: 23757
- 500 mg c/ 360 comprimidos (36x10) • Reg. MS 1.2568.0050.008-7 • Cód.: 23758
- 750 mg c/ 20 comprimidos revestidos (2x10) • Reg. MS 1.2568.0050.026-5 • Cód.: 23768
- 750 mg c/ 360 comprimidos revestidos (25x12) • Reg. MS 1.2568.0050.015-1 • Cód.: 23770

**Acesse a bula
do produto:**



Paracetamol

Solução Oral

G Medicamento
Genérico

**NÃO CONTÉM
AÇÚCAR**



Cód.: 01 / 15ml

SOLUÇÃO

REFERÊNCIA
TYLENOL /Janssen Cilag

CLASSE TERAPÊUTICA
Analgésicos Não Narcóticos


Paracetamol

Solução Oral

CLASSE TERAPÊUTICA – ANALGÉSICO NÃO NARCÓTICO
USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE O PARACETAMOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais. Em bebês e crianças é indicado para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves e moderadas tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente e dor de garganta.



COMO O PARACETAMOL FUNCIONA?

Este medicamento reduz a febre atuando no centro regulador da temperatura no Sistema Nervoso Central (SNC) e diminui a sensibilidade para a dor. Seu efeito tem início 15 a 30 minutos após a administração oral e permanece por um período de 4 a 6 horas.

***Acesse a bula
do produto:***



APRESENTAÇÕES

SOLUÇÃO

- 200 mg/ml solução 15 ml gotas • Reg. MS 1.2568.0027.002-2 • Cód.: 01

Permetrina

Loção

G Medicamento
Genérico



Acompanha
Pente Fino



Cód.: 14586 / 60ml

**GENÉRICO
EXCLUSIVO**

REFERÊNCIA

KWELL - GlaxosmithKline Brasil LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos com ação na pele e mucosas

FONTE:

IQVIA MAT MARÇO/2022

Permetrina

Loção

CLASSE TERAPÊUTICA - OUTROS PRODUTOS COM AÇÃO NA PELE E MUCOSAS

USO EXTERNO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

PARA QUE PERMETRINA É INDICADO?

Indicado no tratamento de infestação por piolhos e lêndeas (ovos de piolhos).



COMO PERMETRINA FUNCIONA?

Permetrina age sobre os piolhos provocando paralisia do inseto, facilitando sua remoção.

APRESENTAÇÃO

10 mg/g loção 60 ml + pente fino
Reg. MS 1.2568.0240.001-2
Cód.: 14586

**Acesse a bula
do produto:**



Pratiderm

Nistatina+Óxido de Zinco

Pomada

E Medicamento
Específico



Cód.: 178 / 60g

REFERÊNCIA

DERMODEX / Takeda

CLASSE TERAPÊUTICA

Antimicótico para uso tópico

Pratiderm

Nistatina+Óxido de Zinco

Pomada

CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIMICÓTICO PARA USO TÓPICO


USO TÓPICO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE PRATIDERM É INDICADO?

A indicação principal de Pratiderm é para assaduras de bebês, principalmente relacionadas ao uso de fraldas. Além dessa indicação, este medicamento pode ser usado em crianças maiores e adultos, no tratamento de irritações na região dos órgãos genitais e das nádegas, entre os dedos, nas axilas, sob os seios ou em outras áreas da pele que sofrem atrito.

COMO PRATIDERM FUNCIONA?

Diversos trabalhos mostram que em assaduras de bebês é comum a infecção pelo fungo conhecido como Cândida (é o mesmo fungo que aparece na boca de bebês com o nome de “sapinho” e em inúmeros corrimentos vulvovaginais). Pratiderm tem na sua fórmula duas substâncias, uma que age eliminando esse fungo e a outra que cicatriza e protege a pele por meio da formação de uma camada protetora que reduz a fricção entre a pele e as fraldas e impede o contato da pele com urina e fezes. Geralmente as assaduras das crianças regredem após 24 a 48 horas de tratamento. Mantenha o tratamento até o total desaparecimento dos sintomas.



APRESENTAÇÃO

100.000 UI/g + 200 mg/ g pomada 60 g

Reg. MS 1.2568.0138.001-8

Cód.: 178

**Acesse a bula
do produto:**



Simeticona

Emulsão



**NÃO CONTÉM
AÇÚCAR (GOTAS)**



Medicamento
**Notificação
simplificada**

**NOVA
EMBALAGEM**



Cód.: 164 / 15ml

CLASSE TERAPÊUTICA

Adsorventes e antifiséticos intestinais simples

Simeticona

Emulsão

CLASSE TERAPÊUTICA

ADSORVENTES E ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS SIMPLES

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO.

PARA QUE A SIMETICONA É INDICADA?

Este medicamento é indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, que causa desconforto abdominal, aumento do volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases alivia estes sintomas. Este medicamento também pode ser usado como medicação auxiliar no preparo dos pacientes em exames médicos, tais como endoscopia digestiva (exame do interior do esôfago, estômago e intestino) e/ou colonoscopia (exame do interior do intestino grosso).



COMO A SIMETICONA FUNCIONA?

Entre 10 e 30 minutos após a sua ingestão, a simeticona atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas, ou à formação de bolhas maiores que serão facilmente expelidas. As bolhas dos gases são as responsáveis pela dor abdominal e pela flatulência (acúmulo de gases), e a sua eliminação resulta no alívio dos sintomas associados com a retenção dos gases.

APRESENTAÇÃO

75 mg/ml emulsão 15 ml gotas

Reg. MS 1.2568.0137.003-9 • Cód.: 164

**Acesse a bula
do produto:**



Sulfato de Neomicina

Creme

G Medicamento
Genérico



Cód.: 6514 / 20g

**GENÉRICO
EXCLUSIVO**

REFERÊNCIA
POMICINA / Belfar Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antinfeciosos tópicos

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022


Sulfato de Neomicina

Creme

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTINFECIOSOS TÓPICOS
Uso TÓPICO - Uso ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE SULFATO DE NEOMICINA É INDICADO?

Sulfato de neomicina creme dermatológico está indicado para o tratamento e profilaxia das infecções da pele de qualquer natureza, inclusive traumática ou feridas cirúrgicas.



COMO SULFATO DE NEOMICINA FUNCIONA?

Age de maneira a combater as principais e mais comuns infecções da pele.

APRESENTAÇÃO

3,5 mg/g creme 20 g
Reg. MS 1.2568.0196.003-0
Cód.: 6514

**Acesse a bula
do produto:**



Sulfato de Neomicina+ Bacitracina Zíncica Pomada

G Medicamento
Genérico



Cód.: 125 / 15g



Cód.: 127 / 50g

REFERÊNCIA

NEBACETIN / Altana Pharma AG

CLASSE TERAPÊUTICA

Antinfeciosos tópicos - associações medicamentosas.

Sulfato de Neomicina+ Bacitracina Zíncica

Pomada

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTINFECIOSOS TÓPICOS
ASSOCIAÇÕES MEDICAMENTOSAS.
USO DERMATOLÓGICO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO




PARA QUE SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA É INDICADO?

Este é um medicamento indicado para o tratamento de infecções da pele e/ou de mucosas, causadas por diferentes bactérias, como por exemplo: nas “dobras” da pele, ao redor dos pelos, na parte de fora da orelha, nos furúnculos, nas lesões com pus, na acne infectada, nas feridas abertas (como úlceras na pele) e nas queimaduras de pele. Também é indicado para prevenir infecções de pele e/ou de mucosas após ferimentos, cortes (inclusive de cirurgias) e queimaduras pequenas.

COMO SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA FUNCIONA?

Este medicamento contém dois antibióticos, a neomicina e a bacitracina zíncica, que juntos inibem o crescimento de vários tipos de bactérias, principalmente as que costumam causar infecções de pele e de mucosas. Por isto, é eficaz para tratar e para prevenir infecções de pele e de mucosas. Os efeitos deste medicamento começam logo após sua aplicação. Na maioria dos casos, pode-se observar a melhora da lesão cerca de dois ou três dias após o início do tratamento. Contudo, a resposta ao tratamento depende, dentre outros fatores, do tamanho e tipo da lesão e da defesa do organismo do paciente. Caso não seja observada uma melhora, informe seu médico.



APRESENTAÇÕES

5 mg/g + 250 UI/g pomada 50 g
Reg. MS 1.2568.0128.002-1
Cód.: 127

5 mg/g + 250 UI/g pomada 15 g
Reg. MS 1.2568.0128.003-1
Cód.: 125

**Acesse a bula
do produto:**



MEDICAMENTOS | RX COM PRESCRIÇÃO MÉDICA

 **prati**
donaduzzi

...



Uma empresa que faz
a diferença na vida dos
BRASILEIROS!

RX

MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

São medicamentos que devem ser prescritos pelo profissional médico, dentista ou médico veterinário.

Dividem-se em:

TARJA	PRESCRIÇÃO	VENDA	RECEITA
Vermelha	Sob prescrição médica	Sem retenção de receita	Branca simples (em uma via)
Vermelha Antibiótico	Sob prescrição médica	Com retenção da 2ª via da receita e escrituração via SNGPC*	Branca simples (em duas vias)
	Fracionado	Com retenção da 2ª via da receita	Branca simples (em duas vias)
Vermelha Portaria 344/98	Sob prescrição médica	Com retenção da 1ª via da receita e escrituração via SNGPC*	Branca especial (em duas vias)
Preta Portaria 344/98	Sob prescrição médica	Com notificação da receita B	Azul acompanhada de receita branca

Acetato de Dexametasona

Creme

G Medicamento Genérico



Cód.: 122 / 10g



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
DEXASON / Laboratório Teuto Brasileiro S.A

CLASSE TERAPÊUTICA
Glicocorticóides tópicos exceto uso oftálmico

Acetato de Dexametasona

Creme

**CLASSE TERAPÊUTICA – GLICOCORTICOIDES TÓPICO
SIMPLES EXCETO USO OPTÁLMICO**

USO DERMATOLÓGICO.


USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE DEXAMETASONA É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de doenças inflamatórias e pruriginosas (que causam coceira) da pele, incluindo eczemas (lesões das pregas cutâneas, com coceira e secreção), dermatites seborreicas (lesões avermelhadas e úmidas de áreas como face ou pescoço) e neurodermatites (lesões secas e delimitadas da pele).

COMO DEXAMETASONA FUNCIONA?

Este medicamento contém como princípio ativo a dexametasona que é um corticosteroide que atua no alívio da coceira e dos sintomas de inflamação. O início do alívio é quase imediato, mas as aplicações devem ser mantidas na frequência e pelo prazo prescrito pelo médico.



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

APRESENTAÇÃO

1 mg/g creme 10g

Reg. MS 1.2568.0 126.001-2

Cód.: 122

**Acesse a bula
do produto:**



Aciclovir

Comprimido e Creme

G Medicamento
Genérico



Cód.: 3999/ 3x10

Cód.: 19078/ 3x10

REFERÊNCIA

Aciclovir-Merck S.A

Zovirax - GLAXO SMITHKLINE BRASIL LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA

Antiviróticos



Cód.: 92 / 10 g

REFERÊNCIA

ZOVIRAX / GSK Brasil Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Antiviróticos



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Aciclovir

Comprimido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTEVIRÓTICOS
USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

PARA QUE O ACICLOVIR É INDICADO?

Este medicamento é indicado para: o tratamento de *Herpes zoster*; o tratamento e recorrência (reaparecimento) das infecções de pele e mucosas causadas pelo vírus *Herpes simplex*; a prevenção de infecções recorrentes causadas pelo vírus *Herpes simplex* (supressão). Este medicamento também é indicado para pacientes seriamente imunocomprometidos.

COMO O ACICLOVIR FUNCIONA?

Este medicamento contém como substância ativa o fármaco aciclovir, um agente antiviral muito ativo contra o vírus do *Herpes simplex* (HSV), tipos 1 e 2, vírus da *Varicela zoster* (VZV), vírus *Epstein Barr* (VEB) e *Citomegalovírus* (CMV). Este medicamento atua bloqueando os mecanismos de multiplicação desses vírus.

APRESENTAÇÕES

200 mg comprimido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0163.002-2
Cód.: 3999

400 mg comprimido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0285.003-4
Cód.: 19078

Acesse a bula do produto:



Creme

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIVIRÓTICOS

USO TÓPICO (CREME) – 50MG/G
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE ACICLOVIR É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de infecções na pele causadas pelo vírus *Herpes simplex*, incluindo herpes genital e labial, seja o primeiro episódio ou episódios que se repetem.

COMO ACICLOVIR FUNCIONA?

Este medicamento pertence a um grupo de medicamentos chamados antivirais (agem contra vírus). Ele contém como substância ativa o aciclovir, um agente antiviral muito ativo contra o vírus *Herpes simplex* (VHS) e contra o vírus *Varicela-zoster* (VZV). O aciclovir bloqueia os mecanismos de multiplicação do vírus *Herpes simplex* e do *Varicela-zoster*.

APRESENTAÇÃO 50 mg/g creme 10 g • Reg. MS 1.2568.0111.001-0 • Cód.: 92

Acesse a bula do produto:



Albendazol

Comprimido Mastigável

G Medicamento
Genérico

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**

Cód.: 12158 / 10x10



Cód.: 12519 / 1x1

Cód.: 16312 / 1x3

Cód.: 16313 / 1x5

REFERÊNCIA
ZENTEL / GSK Brasil Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Anti-helmínticos do trato gastrointestinal.

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Albendazol

Comprimido Mastigável




CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HELMÍNTICOS DO TRATO GASTRINTESTINAL

COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400MG

USO ORAL - ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 2 ANOS)

PARA QUE ALBENDAZOL É INDICADO?

Este medicamento é usado para tratar uma grande variedade de condições causadas por vermes ou parasitas. Estudos mostram que o albendazol é eficaz no tratamento de infecções por *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia spp.* e *Hymenolepis nana*; de opistorquíase (*Opisthorchis viverrini*) e larva migrans cutânea; e de giardiase (*Giardia lamblia*, *G. duodenalis*, *G. intestinalis*) em crianças.



COMO ALBENDAZOL FUNCIONA?

Este medicamento pertence a uma classe de compostos anti-helmínticos e antiparasitários benzimidazólicos; e tem a capacidade de eliminar vermes e parasitas do seu corpo, matando-os.

APRESENTAÇÕES

400 mg c/ 1 comprimido mastigável (1x1)

Reg. MS 1.2568.0052.001-0

Cód.: 12519

400 mg c/3 comprimidos mastigáveis (1x3)

Reg. MS 1.2568.0052.016-9

Cód.: 16312

400 mg c/5 comprimidos mastigáveis (1x5)

Reg. MS 1.2568.0052.017-7

Cód.: 16313

400 mg c/ 100 comprimidos mastigáveis (10x10)

Reg. MS 1.2568.0052.002-9

Embalagem Fracionável - Cód.: 12158

**Acesse a bula
do produto:**



Albendazol

Suspensão Oral

G Medicamento
Genérico



Cód.: 141 / 10 mL



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
ZENTEL / GSK Brasil Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Anti-helmínticos do trato gastrointestinal.

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022

Albendazol

Suspensão Oral




CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HELMÍNTICOS DO TRATO GASTROINTESTINAL

SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML

USO ORAL – ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 2 ANOS)

PARA QUE ALBENDAZOL É INDICADO?

Este medicamento é usado para tratar uma grande variedade de condições causadas por vermes ou parasitas. Estudos mostram que o albendazol é eficaz no tratamento de infecções por *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia spp.* e *Hymenolepis nana*; de opistorquíase (*Opisthorchis viverrini*) e larva migrans cutânea; e de giardíase (*Giardia lamblia*, *G. duodenalis*, *G. intestinalis*) em crianças.



COMO ALBENDAZOL FUNCIONA?

Este medicamento pertence a uma classe de compostos anti-helmínticos e antiparasitários benzimidazólicos; e tem a capacidade de eliminar vermes e parasitas do seu corpo, matando-os.

APRESENTAÇÕES

40 mg/mL suspensão oral 10mL

Reg. MS 1.2568.0029.003-1

Cód.: 141

**Acesse a bula
do produto:**



Alopurinol

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 5827 / 2x15

Cód.: 5828 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
ZYLORIC / Glaxosmithkline Brasil Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA
Antigotosos

Alopurinol

Comprimido

**ATENÇÃO**


Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIGOTOSOS
COMPRIMIDO 100MG E 300MG

USO ORAL
ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS

PARA QUE ALOPURINOL É INDICADO?

Este medicamento é usado para prevenir crises de gota e outras condições associadas com o excesso de ácido úrico no corpo, entre elas, pedras nos rins e certos tipos de doença renal.



COMO ALOPURINOL FUNCIONA?

Este medicamento pertence a um grupo de medicamentos chamados inibidores enzimáticos, que agem controlando a velocidade com que modificações químicas especiais ocorrem no corpo. Alopurinol atua reduzindo a produção de ácido úrico, que é sintetizado pelo nosso organismo. O tempo médio estimado para início da ação farmacológica do medicamento é de uma a duas semanas (efeito máximo).

APRESENTAÇÕES

100 mg c/ 30 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0191.001-7
Cód.: 5827

300 mg c/ 30 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0191.004-1
Cód.: 5828

Acesse a bula do produto:



Amoxicilina

Cápsula Dura

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

ATENÇÃO
Antibiótico
Medicamento

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**



Cód.: 5148 / 1x21

Cód.: 12124 / 28x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
AMOXIL / GSK Brasil Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Penicilina de amplo espectro

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022

Amoxicilina

Cápsula Dura

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.


CLASSE TERAPÊUTICA – PENICILINA DE AMPLO ESPECTRO

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS

ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

PARA QUE AMOXICILINA É INDICADA?

Este medicamento é um antibiótico eficaz contra grande variedade de bactérias, é indicado para tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis à ação da amoxicilina. Entretanto, seu médico pode receitar este medicamento para outro uso.



COMO AMOXICILINA FUNCIONA?

Este medicamento contém uma penicilina chamada amoxicilina como ingrediente ativo. A amoxicilina pertence ao grupo dos antibióticos penicilânicos. Este medicamento é usado no tratamento de uma gama de infecções causadas por bactérias, que podem manifestar-se nos pulmões (pneumonia e bronquite), nas amígdalas (amigdalite), nos seios da face (sinusite), no trato urinário e genital, na pele e nas mucosas. Este medicamento atua destruindo as bactérias que causam essas infecções.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÕES

- 500 mg c/ 21 cápsulas duras • Reg - MS 1.2568.0147.002-5 • Cód.: 5148

- 500 mg c/ 280 cápsulas duras • Reg. MS 1.2568.0147.007-6 • Cód.: 12124 - Embalagem Fracionável

Amoxicilina

Pó para Suspensão



Cód.: 6786 / 60 ml

Cód.: 4948 / 150 ml

CLASSE TERAPÊUTICA – PENICILINA DE AMPLO ESPECTRO

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

PARA QUE AMOXICILINA É INDICADA?

Este medicamento é um antibiótico eficaz contra grande variedade de bactérias, é indicado para tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis à ação da amoxicilina. Entretanto, seu médico pode receitar este medicamento para outro uso.

COMO AMOXICILINA FUNCIONA?

Este medicamento contém uma penicilina chamada amoxicilina como ingrediente ativo. A amoxicilina pertence ao grupo dos antibióticos penicilínicos. Este medicamento é usado no tratamento de uma gama de infecções causadas por bactérias, que podem manifestar-se nos pulmões (pneumonia e bronquite), nas amígdalas (amigdalite), nos seios da face (sinusite), no trato urinário e genital, na pele e nas mucosas. Este medicamento atua destruindo as bactérias que causam essas infecções.

APRESENTAÇÕES

- 50 mg/mL pó para suspensão oral 60 ml • Reg. MS 1.2568.0156.001-6 • Cód.: 6786

- 50 mg/mL pó para suspensão oral 150 ml • Reg. MS 1.2568.0156.003-2 • Cód.: 4948

G Medicamento Genérico

Medicamento com Retenção de receita


ATENÇÃO Antibiótico Medicamento

ATENÇÃO CONTÉM AÇÚCAR

Acompanha Copo Medida

REFERÊNCIA
AMOXIL / GSK Brasil Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Penicilina de amplo espectro



Acesse a bula do produto:



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio

Pó para suspensão

Cód.: 17702 / 70 ml

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS

ASSOCIAÇÃO MEDICAMENTOSA
ENTRE ANTI-INFECCIOSOS.

USO ORAL - USO ADULTO E
PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 MESES

ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!



PARA QUE AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO É INDICADA?

Amoxicilina + clavulanato de potássio para administração oral, duas vezes ao dia, é um antibiótico indicado para tratamento de infecções bacterianas (causadas por bactérias) comuns, como: infecções das vias respiratórias superiores, inclusive ouvido, nariz e garganta (em particular sinusite, otite média e amigdalite); infecções das vias respiratórias inferiores, como bronquite crônica e broncopneumonia; infecções urinárias, em particular cistite; e infecções da pele e dos tecidos moles, em particular celulite, mordidas de animais e abscesso dentário grave com celulite disseminada.

COMO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO FUNCIONA?

Este medicamento é um antibiótico que contém como princípios ativos a amoxicilina e o clavulanato de potássio. A amoxicilina é um antibiótico de amplo espectro de ação, ou seja, age contra um número grande de bactérias. É, no entanto, sensível à degradação por enzimas conhecidas como betalactamases e, por isso, o espectro de ação da amoxicilina não inclui os micro-organismos produtores dessas enzimas. O ácido clavulânico é um betalactâmico que tem a capacidade de inativar grande variedade de enzimas betalactamases. Portanto, a presença dele na fórmula deste medicamento protege a amoxicilina da degradação por essas enzimas e aumenta de forma efetiva o espectro antibacteriano da amoxicilina por incluir muitas bactérias normalmente resistentes a ela e a outras penicilinas e cefalosporinas. Assim, este medicamento é capaz de destruir e eliminar ampla variedade de micro-organismos.

APRESENTAÇÃO

– Pó para suspensão de 400 mg/5 mL + 57 mg/5 mL
Reg - MS - 1.2568.0256.001-1 • Cód.: 17702

G Medicamento Genérico

Medicamento com Retenção de receita

ATENÇÃO
Antibiótico
Medicamento

Acompanha
Seringa
Dosadora

REFERÊNCIA
CLAVULIN BD/ Glaxosmithkline

CLASSE TERAPÊUTICA
Antibióticos Sistêmicos –
Associação Medicamentosa
entre Anti-infecciosos



Acesse a bula do produto:



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Ampicilina

Cápsula dura

Pó para Suspensão Oral

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

ATENÇÃO
Antibiótico
Medicamento

ATENÇÃO
CONTÉM AÇÚCAR

 Acompanha
Copo Medida *2

 Sabor
Tutti-Frutti *2



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

***1 - AMPICILINA - CÁPSULA DURA**

REFERÊNCIA: AMPLACILINA / Eurofarma Laboratórios Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA: Penicilina de amplo espectro

FONTE: IQVIA MAT MARÇO/2022

***2 - AMPICILINA - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL**

REFERÊNCIA: AMPLACILINA / Eurofarma Laboratórios Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA: Penicilina de amplo espectro

FONTE: IQVIA MAT MARÇO/2022

Ampicilina

Cápsula dura

Pó para Suspensão Oral

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA

PENICILINA DE AMPLO ESPECTRO

SUSPENSÃO: USO ADULTO E PEDIÁTRICO

CAPSULAS: USO ADULTO

SABOR: TUTTI-FRUTTI



ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR!

(AMPICILINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL)


ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

PARA QUE AMPICILINA É INDICADO?

A ampicilina é indicada para tratar diversas infecções causadas por micro-organismos sensíveis a ela, como infecções do trato urinário, respiratório, digestivo e biliar; também é indicado nas infecções bucais, extrações infectadas e outras intervenções cirúrgicas, além das infecções causadas por enterococos, tanto as sistêmicas quanto as localizadas.

COMO AMPICILINA FUNCIONA?

A ampicilina é indicada no tratamento de várias infecções, pois ocasiona a morte de micro-organismos sensíveis a este medicamento. Sua ação começa poucos minutos após a administração, mantendo-se adequada por 6 horas ou mais.



APRESENTAÇÕES

50 mg/mL pó para suspensão oral 150 mL

Reg. MS 1.2568.0144.007-1

Cód.: 6470

500 mg c/ 12 cápsulas duras

Reg. MS 1.2568.0201.001-1

Cód.: 7450

500 mg c/ 21 cápsulas duras

Reg. MS 1.2568.0201.002-8

Cód.: 7451

Acesse a bula do produto:



Aripiprazol

Comprimido

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 20352/2x15

Cód.: 20353/2x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Abilify - Bristol-Myers Squibb Farmacêutica S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Antipsicóticos.

Aripiprazol

Comprimido



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIPSICÓTICOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O ARIPIPAZOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de esquizofrenia. Transtorno Bipolar - Monoterapia: este medicamento é indicado para o tratamento agudo e de manutenção de episódios de mania e mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I. Terapia adjuntiva (terapia complementar à terapia principal): este medicamento é indicado como terapia complementar à terapia com lítio ou valproato para o tratamento agudo de episódios de mania ou mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I.



COMO O ARIPIPAZOL FUNCIONA?

O mecanismo de ação do aripiprazol, como ocorre com outras drogas eficazes no tratamento de esquizofrenia e transtorno bipolar, é desconhecido. No entanto, foi proposto que a eficácia do aripiprazol é mediada por efeitos em receptores no sistema nervoso central. A atividade deste medicamento é principalmente devida à droga inalterada, aripiprazol, e em menor medida ao seu metabólito principal, dehidro-aripiprazol.

APRESENTAÇÕES

10 mg comprimido (2x15)
Reg. MS 1.2568.0290.003-1
Cód.: 20352

15 mg comprimido (2x15)
Reg. MS 1.2568.0290.009-0
Cód.: 20353

**Acesse a bula
do produto:**



Atenolol

Comprimido

G Medicamento
Genérico



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
ATENOL / AstraZeneca do Brasil Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA
Betabloqueadores simples

Atenolol

Comprimido

**ATENÇÃO**


Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – BETABLOQUEADORES SIMPLES

Uso ORAL- Uso ADULTO

PARA QUE ATENOLOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o controle da hipertensão arterial (pressão alta), controle da angina pectoris (dor no peito ao esforço), controle de arritmias cardíacas, infarto do miocárdio e tratamento precoce e tardio após infarto do miocárdio.



COMO ATENOLOL FUNCIONA?

Este medicamento age preferencialmente sobre os receptores localizados no coração e na circulação, reduzindo a pressão arterial, quando usado continuamente. Este medicamento começa a ter uma ação significativa dentro de 1 hora após sua administração por via oral, atingindo seu efeito máximo em 2 a 4 horas. Esse efeito é mantido por no mínimo 24 horas.

APRESENTAÇÕES

25 mg c/ 30 comprimidos

Reg. MS 1.2568.0146.001-1

Cód.: 4009

50 mg c/ 30 comprimidos

Reg. MS 1.2568.0146.005-4

Cód.: 4013

100 mg c/ 30 comprimidos

Reg. MS 1.2568.0146.009-7

Cód.: 4020

Acesse a bula do produto:



Aurom

Comprimido



Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 24317 / 1x2



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
MAXALT® – ORGANON FARMACÊUTICA LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA
Analgésico Contra Enxaqueca

Aurom

Comprimido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANALGÉSICO CONTRA ENXAQUECA
Uso ORAL- Uso ADULTO

PARA QUE AUROM É INDICADO?

Aurom é um medicamento indicado para o tratamento de crises de enxaqueca.



COMO AUROM FUNCIONA?

O tratamento com Aurom:

1. Reduz o inchaço dos vasos sanguíneos em torno do cérebro. Esse inchaço causa a dor de cabeça durante a crise da enxaqueca;
2. Bloqueia a liberação de substâncias das terminações nervosas que causam mais dor e outros sintomas da enxaqueca;
3. Interrompe o envio de sinais específicos de dor para seu cérebro.

APRESENTAÇÕES

10 mg c/ 2 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0338.001-5
Cód.: 24317

Acesse a bula do produto:



Azitromicina Di-hidratada

Comprimido Revestido 1g e 500mg

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

 **ATENÇÃO**
Antibiótico
Medicamento

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**



Cód.: 12400 / 50x3

Cód.: 6489 / 150x1



Cód.: 6248 / 1x3

Cód.: 15973 / 1x5

Cód.: 6487 / 1x1

1 - AZITROMICINA DI-HIDRATADA COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG

REFERÊNCIA: ZITROMAX / Laboratórios Pfizer Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA: Antibióticos sistêmicos simples

FONTE: IQVIA MAT MARÇO/2022

2 - AZITROMICINA DI-HIDRATADA COMPRIMIDO REVESTIDO 1G

REFERÊNCIA: AZI / Sigma Pharma Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA: Antibióticos sistêmicos simples

FONTE: IQVIA MAT MARÇO/2022



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Azitromicina Di-hidratada



Comprimido Revestido 500mg

CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS SIMPLES
USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 45KG
ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

ACESSE A BULA DA
AZITROMICINA DI-HIDRATADA
COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG:



PARA QUE AZITROMICINA DI-HIDRATADA COMPRIMIDO 500MG É INDICADO?

Este medicamento é indicado no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis à azitromicina; em infecções do trato respiratório inferior (brônquios e pulmões) e superior (nariz, faringe, laringe e traqueia), incluindo sinusite (infecção nos seios da face), faringite (inflamação da faringe) ou amigdalite (inflamação das amígdalas); infecções da pele e tecidos moles (músculos, tendões, gordura); em otite média (infecção do ouvido médio) aguda e nas doenças sexualmente transmissíveis não complicadas nos genitais de homens e mulheres, causadas pelas bactérias *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*. É também indicado no tratamento de cancro (lesão de pele) devido a *Haemophilus ducreyi* (espécie de bactéria). Infecções que ocorrem junto com sífilis (doença sexualmente transmissível) devem ser excluídas.

COMO AZITROMICINA DI-HIDRATADA COMPRIMIDO 500MG FUNCIONA?

Este medicamento é um antibiótico que age impedindo que as bactérias sensíveis à azitromicina produzam proteínas, que são a base do seu crescimento e reprodução. Seu pico de ação é após 2 a 3 horas da administração por via oral deste medicamento.

Comprimido Revestido 1g

CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS SIMPLES
USO ORAL - USO ADULTO

ACESSE A BULA DA
AZITROMICINA DI-HIDRATADA
COMPRIMIDO REVESTIDO 1G:



PARA QUE AZITROMICINA DI-HIDRATADA COMPRIMIDO 1G É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de infecções do trato respiratório inferior (incluindo bronquite e pneumonia) e superior, incluindo sinusite (infecção nos seios da face), faringite (inflamação da faringe) e amigdalite (inflamação das amígdalas); infecções da pele e tecidos moles; em otite média aguda (infecção do ouvido médio) e nas doenças sexualmente transmissíveis devido à clamídia e gonorreia não complicadas.

É também indicado no tratamento de cancro devido a *Haemophilus ducreyi* (tipo de bactéria). Infecções que ocorrem junto com sífilis devem ser excluídas.

COMO AZITROMICINA DI-HIDRATADA COMPRIMIDO 1G FUNCIONA?

Este medicamento é um antibiótico que age impedindo que as bactérias sensíveis à azitromicina produzam proteínas, que são a base para o seu crescimento e reprodução. Após 2 a 3 horas da administração por via oral, a medicação atinge a mais alta concentração no sangue. Não é conhecido o tempo exato do início de ação por administração oral.

1 - APRESENTAÇÕES EM COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG

- 500 mg c/ 3 comprimidos revestidos (1x3) - Reg. MS 1.2568.0183.002-1 - Cód.:6248
 - 500 mg c/ 5 comprimidos revestidos (1x5) - Reg. MS 1.2568.0183.012-9 - Cód.:15973
 - 500 mg c/ 150 comprimidos revestidos (50x3) - Reg. MS 1.2568.0183.010-2 - Cód.: 12400
- Embalagem Fracionável

2 - APRESENTAÇÕES EM COMPRIMIDO REVESTIDO 1G

- 1 g c/ 1 comprimido revestido (1x1) - Reg. MS 1.2568.0187.001-5 - Cód.:6487
 - 1g c/ 150 comprimidos revestidos (150 x 1) - Reg. MS 1.2568.0187.005-8 - Cód.:6489
- Embalagem fracionável



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Azitromicina Di-hidratada Pó para Suspensão

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

 **ATENÇÃO**
Antibiótico
Medicamento

 **ATENÇÃO**
CONTÉM AÇÚCAR

 Acompanha
Seringa
Dosadora



Cód.: 13209 / 15ml

Cód.: 13215 / 22,5ml

REFERÊNCIA: ASTRO / Eurofarma
CLASSE TERAPÊUTICA: Antibióticos sistêmicos simples



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Azitromicina Di-hidratada Pó para Suspensão

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS SIMPLES

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR! ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

PARA QUE AZITROMICINA DI-HIDRATADA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL É INDICADO?

Este medicamento é indicado no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis à azitromicina; em infecções do trato respiratório inferior (brônquios e pulmões) e superior (nariz, faringe, laringe e traqueia), incluindo sinusite (infecções nos seios da face), faringite (inflamação da faringe) ou amigdalite (inflamação das amígdalas); infecções da pele e tecidos moles (músculos, tendões, gordura); em otite média (infecção do ouvido médio) aguda e nas doenças sexualmente transmissíveis não complicadas no homem e na mulher, devido à clamídia e gonorreia (tipos de bactérias). É também indicado no tratamento de cancro (lesão de pele) devido a *Haemophilus ducreyi* (espécie de bactéria). Infecções que ocorrem junto com sífilis (doença sexualmente transmissível) devem ser excluídas.



COMO AZITROMICINA DI-HIDRATADA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FUNCIONA?

Este medicamento é um antibiótico que age impedindo que as bactérias sensíveis à azitromicina produzam proteínas, que são a base do seu crescimento e reprodução. Seu pico de ação é após 2 a 3 horas da administração por via oral deste medicamento.

**ACESSE A BULA DA
AZITROMICINA DI-HIDRATADA
PÓ PARA SUSPENSÃO:**



APRESENTAÇÕES

- 40 mg/ml pó para suspensão (900 mg) - 22,5 ml + diluente + seringa dosadora
Reg. MS 1.2568.0185.005-7 - Cód.: 13215
- 40 mg/ml pó para suspensão (600 mg) - 15 ml + diluente + seringa dosadora
Reg. MS 1.2568.0185.007-3 - Cód.: 13209



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Benzoilmetronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônio Creme

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

 **ATENÇÃO**
Antibiótico
Medicamento

Acompanha
10 Aplicadores
Ginecológicos



Cód.: 3830 / 40g



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

COLPISTATIN / Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Produtos ginecológicos tópicos

Benzoilmetronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônio Creme



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – PRODUTOS GINECOLÓGICOS TÓPICOS

USO TÓPICO (INTRAVAGINAL) - USO ADULTO

ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

PARA QUE BENZOILMETRONIDAZOL + NISTATINA + CLORETO DE BENZALCÔNIO É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de corrimentos e infecções genitais.



COMO BENZOILMETRONIDAZOL + NISTATINA + CLORETO DE BENZALCÔNIO FUNCIONA?

Este medicamento apresenta em sua formulação uma associação de agentes específicos de ampla e comprovada eficácia contra infecções causadas por *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* e *Trichomonas vaginalis*, que são os principais agentes responsáveis por uma série de corrimentos genitais, como a candidíase, vaginose bacteriana e a tricomoniase.

APRESENTAÇÃO

62,5 mg/g + 25.000 UI/g + 1,25 mg/g creme
vaginal 40g + 10 aplicadores ginecológicos.
Reg. MS 1.2568.0162.001-9
Cód.: 3830

**Acesse a bula
do produto:**



Besilato de Anlodipino

Comprimido

G Medicamento Genérico



Cód.: 6824 / 3x10

Cód.: 19173 / 6x10

Cód.: 6826 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
NORVASC/ Laboratório Pfizer Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA
Anti-hipertensivo simples

Besilato de Anlodipino Comprimido

**ATENÇÃO**


Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HPERTENSIVO SIMPLES

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O BESILATO DE ANLORIPINO É INDICADO?

Este medicamento é indicado como medicamento de primeira escolha no tratamento da hipertensão (pressão alta) e angina de peito (dor no peito, por doença do coração) devido à isquemia miocárdica (falta de sangue no coração). Este medicamento pode ser usado isoladamente ou em combinação com outros medicamentos para tratar as mesmas indicações acima.



COMO O BESILATO DE ANLODIPINO FUNCIONA?

O anlodipino, princípio ativo deste medicamento, interfere no movimento do cálcio para dentro das células cardíacas e da musculatura dos vasos sanguíneos. Como resultado dessa ação, o anlodipino relaxa os vasos sanguíneos que irrigam o coração e o resto do corpo, aumentando a quantidade de sangue e oxigênio para o coração, reduzindo a sua carga de trabalho e, por relaxar os vasos sanguíneos, permite que o sangue passe através deles mais facilmente.

APRESENTAÇÕES

5 mg c/ 30 comprimidos (3x10)

Reg. MS 1.2568.0197.002-8

Cód.: 6824

5 mg c/ 60 comprimidos (6x10)

Reg. MS 1.2568.0197.017-6

Cód.: 19173

10 mg c/ 30 comprimidos (3x10)

Reg. MS 1.2568.0197.006-0

Cód.: 6826

Acesse a bula do produto:



Brometo de Ipratrópio

Solução para Inalação

G Medicamento Genérico



Cód.: 65 / 20ml



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

ATROVENT / Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Broncodilatadores

Brometo de Ipratrópio

Solução para Inalação

**ATENÇÃO**


Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – BRONCODILATADORES

USO INALATÓRIO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE BROMETO DE IPRATRÓPIO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de manutenção do broncoespasmo (falta de ar repentina) associado à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que inclui bronquite crônica (inflamação dos canais das vias respiratórias), enfisema (doença pulmonar crônica que destrói a estrutura dos pulmões e geralmente afeta pessoas que fumam há muito tempo). Você pode usar este medicamento junto com medicamentos como fenoterol no tratamento do broncoespasmo agudo (falta de ar repentina) relacionado com a asma e a DPOC, incluindo bronquite crônica.



COMO BROMETO DE IPRATRÓPIO FUNCIONA?

Este medicamento atua como broncodilatador (dilata os canais das vias respiratórias, facilitando e aumentando a passagem de ar). O efeito inicia-se em poucos minutos após a inalação, mais comumente entre 3 e 30 minutos, e dura, em média, de 5 a 6 horas.

APRESENTAÇÃO

0,250 mg/ml solução para inalação 20ml gotas.

Reg. MS 1.2568.0090.001-8

Cód.: 65

Acesse a bula do produto:



Bromidrato de Citalopram

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita



Cód.: 19136/3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

CIPRAMIL/Lundbeck Brasil Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA

Antidepressivos

Bromidrato de Citalopram

Comprimido Revestido



CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIDEPRESSIVOS

Uso ORAL - Uso ADULTO

PARA QUE O BROMIDRATO DE CITALOPRAM É INDICADO?

Este medicamento é indicado para tratar a depressão e, após a melhora, para prevenir a recorrência desses sintomas. É usado em tratamentos de longo prazo para prevenir a recorrência de novos episódios depressivos em pacientes que tem depressão recorrente. É eficaz também para o tratamento de pacientes com transtorno do pânico e para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC).



COMO O BROMIDRATO DE CITALOPRAM FUNCIONA?

Bromidrato de Citalopram é um medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), que é uma classe do grupo dos antidepressivos. Este medicamento age no cérebro, onde corrige as concentrações inadequadas de determinadas substâncias denominadas neurotransmissores, em especial a serotonina, que causam os sintomas na situação de doença.

APRESENTAÇÃO

20 mg comprimido revestido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0272.013-0
Cód.: 19136

**Acesse a bula
do produto:**



Bromidrato de Galantamina

Cápsula Dura de Liberação Prolongada

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita

LIBERAÇÃO PROLONGADA



Cód.: 16874 / 3x10

Cód.: 16875 / 3x10

Cód.: 16878 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

REMINYL ER / Janssen Cilag Farmacêutica Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos que atuam sobre o sistema nervoso

Bromidrato de Galantamina

Cápsula Dura de Liberação Prolongada

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – OUTROS PRODUTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO

USO ORAL - USO ADULTO

MEDICAMENTO CONTROLADO PORTARIA 344/98 – LISTA C1

PARA QUE O BROMIDRATO DE GALANTAMINA É INDICADO?

Este medicamento é usado para tratar a demência do tipo alzheimer de intensidade leve a moderada com ou sem doença vascular cerebral relevante. Os sintomas desta doença, que altera o funcionamento do cérebro, incluem perda progressiva da memória, confusão crescente e problemas de comportamento, o que torna cada vez mais difícil realizar as atividades diárias.



COMO O BROMIDRATO DE GALANTAMINA FUNCIONA?

Este medicamento contém a substância ativa bromidrato de galantamina. Acredita-se que a demência do tipo Alzheimer ocorra devido à falta de acetilcolina, uma substância responsável pela transmissão das mensagens entre as células do cérebro. O bromidrato de galantamina aumenta a quantidade desta substância, exercendo efeito benéfico sobre os sintomas da doença. Os sintomas da demência do tipo Alzheimer diminuem gradativamente depois de algumas semanas.

APRESENTAÇÕES

- 8 mg cápsula de liberação prolongada - 30 cápsulas (3x10) - Reg. MS.: 1.2568.0250.017-3 - Cód.: 16874
- 16 mg cápsula de liberação prolongada - 30 cápsulas (3x10) - Reg. MS.: 1.2568.0250.021-1 - Cód.: 16875
- 24 mg cápsula de liberação prolongada - 30 cápsulas (3x10) - Reg. MS.: 1.2568.0250.026-2 - Cód.: 16878

Acesse a bula do produto:



Bromoprida

Comprimido
e Solução

G Medicamento
Genérico

**NÃO CONTÉM
AÇÚCAR** *2



Cód.: 78 / 20ml

Cód.: 4357 / 1x20



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

1 - BROMOPRIDA COMPRIMIDO 10MG

PLAMET / Libbs Farmacêutica Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA

Antieméticos e antinauseantes

*2 - BROMOPRIDA SOLUÇÃO 4MG/ML

DIGESAN / Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Antieméticos e antinauseantes

Bromoprida

Comprimido



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE BROMOPRIDA COMPRIMIDO É INDICADO?

Bromoprida comprimido é indicado para náuseas, vômitos de qualquer origem e quando se fizer necessário a normalização do tônus e motilidade gastrointestinal. Este medicamento é utilizado em casos de gastrites, úlceras pépticas, refluxo gástrico, hérnias de hiato, náuseas, vômitos e cefaleia do período menstrual e de gestação ou durante viagens, no preparo do paciente para endoscopia, na cefaleia de origem digestiva e em casos de flatulência.



COMO BROMOPRIDA COMPRIMIDO FUNCIONA?

A bromoprida atua como regulador fisiológico específico para o sistema digestivo, tendo ação central e periférica. Possui propriedades de normalização do tônus e motilidade do aparelho digestivo, reconstituição da função fisiológica, diminuição do refluxo gástrico, facilitação do esvaziamento estomacal e impedimento do refluxo biliar.

**ACESSE A BULA DA
BROMOPRIDA COMPRIMIDO:**



Solução

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

USO ORAL - USO PEDIÁTRICO

PARA QUE BROMOPRIDA GOTAS É INDICADO?

Este medicamento está indicado para:

- distúrbios da motilidade gastrointestinal (alteração na movimentação do estômago e intestino);
- refluxo gastroesofágico (presença de conteúdo ácido dentro do esôfago proveniente do estômago);
- náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos). Este medicamento é utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrointestinal.

COMO BROMOPRIDA GOTAS FUNCIONA?

Este é um medicamento que estimula o movimento do tubo digestivo. Tempo médio de início de ação: a ação deste medicamento se inicia 1 a 2 horas após administração por via oral.

**ACESSE A BULA DA
BROMOPRIDA SOLUÇÃO:**



1 - BROMOPRIDA COMPRIMIDO 10MG

• 10 mg c/ 20 comprimidos (1x20) - Reg. MS 1.2568.0180.001-7 - Cód.: 4357

2 - BROMOPRIDA SOLUÇÃO 4MG/ML

• 4 mg/ml solução 20 ml gotas - Reg. MS 1.2568.0093.002-2 - Cód.:78

Cabergolina

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 17476 / 1x2

Cód.: 17477 / 1x8



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Dostinex – Pfizer Itália S.r.l

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos para uso em ginecologia e obstetria

Cabergolina

Comprimido



CLASSE TERAPÊUTICA – OUTROS PRODUTOS PARA USO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE CABERGOLINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para tratamento de aumento de prolactina (hormônio responsável pela produção de leite), bem como de disfunções associadas à hiperprolactinemia (aumento dos níveis de prolactina), como amenorreia (ausência de menstruação), oligomenorreia (redução do fluxo ou da frequência da menstruação), anovulação (ausência de ovulação) e galactorreia (produção de leite fora do período de gestação e lactação); inibição da lactação fisiológica (interrupção da produção de leite em mães que não amamentaram), imediatamente após o parto; supressão da lactação (interrupção da produção de leite em mães que já iniciaram a amamentação) já estabelecida. É indicado à pacientes com adenomas hipofisários (tumores benignos da hipófise) secretores de prolactina (micro e macroprolactinomas), hiperprolactinemia idiopática (aumento dos níveis no sangue de prolactina sem motivo aparente) ou síndrome da sela vazia (doença caracterizada pela ausência da hipófise, glândula produtora de prolactina) com hiperprolactinemia associada.



COMO CABERGOLINA FUNCIONA?

Este medicamento inibe a produção de prolactina de maneira potente e prolongada. Cabergolina é uma medicação agonista (que tem a mesma ação) da dopamina, que age na hipófise impedindo que haja produção da prolactina.

APRESENTAÇÃO:

0,5mg c/2 Cápsulas (1x2)
Reg. MS 1.2568.0257.001-5
Cód.: 17476

0,5mg c/8 Cápsulas (1x8)
Reg. MS 1.2568.0257.002-3
Cód.: 17477

Acesse a bula do produto:



Captopril

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Farmácia
Popular
DO BRASIL



Cód.: 4372/ 2x15

Cód.: 4368/ 2x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
CAPTOSEN /Pharlab
CLASSE TERAPÊUTICA
Anti-hipertensivos simples

Captopril

Comprimido




CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HIPERTENSIVOS SIMPLES

Uso ORAL - USO ADULTO

PARA QUE CAPTOPRIL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de pacientes com hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva (usado com outros medicamentos - diuréticos e digitálicos), infarto do miocárdio e nefropatia diabética (doença renal causada por diabetes).



COMO CAPTOPRIL FUNCIONA?

Este medicamento diminui a pressão arterial. Normalmente, ocorrem reduções máximas da pressão arterial 60 a 90 minutos após a ingestão da dose. A diminuição da pressão arterial pode ser progressiva; assim, para se obter melhores resultados, podem ser necessárias várias semanas de tratamento.

APRESENTAÇÕES

25 mg c/ 30 comprimidos (2x15)

Reg. MS 1.2568.0153-006-0

Cód.: 4368

50 mg c/ 30 comprimidos (2x15)

Reg. MS 1.2568.0153-010-9

Cód.: 4372

**Acesse a bula
do produto:**



Carvedilol

Comprimido

G Medicamento
Genérico

30 Cód: 19678/2x15
60 Cód: 19679/4x15

30 Cód: 19681/2x15
60 Cód: 19682/4x15



30 Cód: 19684/2x15
60 Cód: 19685/4x15

30 Cód: 19687/2x15
60 Cód: 19688/4x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
CARDIOL - Libbs Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Anti-hipertensivos.

Carvedilol

Comprimido




CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HIPERTENSIVOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O CARVEDILOL É INDICADO?

Carvedilol é um medicamento usado para tratar insuficiência cardíaca congestiva (insuficiência do coração), angina do peito (dor no peito de origem cardíaca) e hipertensão arterial (pressão alta).



COMO O CARVEDILOL FUNCIONA?

Carvedilol promove a dilatação dos vasos sanguíneos, através do bloqueio do sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona. Assim, ocorre diminuição da pressão arterial. Em voluntários sadios, a concentração sérica máxima é alcançada em, aproximadamente, uma hora.

APRESENTAÇÕES

3,125 mg c/ 30 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0315.004-4
Cód.: 19678

12,5 mg c/ 30 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0315.022-2
Cód.: 19684

3,125 mg c/ 60 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0315.005-2
Cód.: 19679

12,5 mg c/ 60 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0315.023-0
Cód.: 19685

6,25 mg c/ 30 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0315.013-3
Cód.: 19681

25 mg c/ 30 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0315.031-1
Cód.: 19687

6,25 mg c/ 60 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0315.014-1
Cód.: 19682

25 mg c/ 60 comprimidos
Reg. MS 1.2568.0315.032-1
Cód.: 19688

**Acesse a bula
do produto:**



Cetoconazol

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 6098 / 1x10

Cód.: 6101 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
CANDORAL / Aché
CLASSE TERAPÊUTICA
Antimicótico

Cetoconazol

Comprimido




CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIMICÓTICO

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE CETOCONAZOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de certas infecções causadas por fungos como blastomicose, coccidioidomicose, histoplasmosse, cromomicose e paracoccidioidomicose quando outros tratamentos não forem tolerados ou eficazes.

Este medicamento não deve ser utilizado em casos de meningite fúngica devido a sua baixa penetração no líquido cerebrospinal.



COMO CETOCONAZOL FUNCIONA?

Este é um medicamento a base de cetoconazol e deve ser usado para o tratamento de infecções causadas por fungos. Possui atividade fungicida (agente que destrói fungos) ou fungistática (agente que paralisa crescimento dos fungos). O cetoconazol inibe a biossíntese do ergosterol no fungo e altera a composição de outros componentes lipídicos na membrana.

APRESENTAÇÃO

200 mg c/ 10 comprimidos (1x10)

Reg. MS 1.2568.0192.001-2

Cód.: 6098

200 mg c/ 30 comprimidos (3x10)

Reg. MS 1.2568.0192.004-7

Cód.: 6101

**Acesse a bula
do produto:**



Citrato de Sildenafil

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico



2 Cód.: 18287 / 1x2
4 Cód.: 18288 / 1x4

1 Cód.: 18289 / 1x1
2 Cód.: 18290 / 1x2
4 Cód.: 18291 / 1x4
8 Cód.: 18742 / 2x4

2 Cód.: 18293 / 1x2
4 Cód.: 18294 / 1x4



**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**

Cód.: 18297 / 6x10
Embalagem Fracionável



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
Viagra - Laboratórios Pfizer Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA
Vasodilatadores

Citrato de Sildenafil

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – VASODILATADORES

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE CITRATO DE SILDENAFILA É INDICADO?

Este medicamento está indicado para tratamento da disfunção erétil, que se entende como sendo a incapacidade de atingir ou manter uma ereção suficiente para um desempenho sexual satisfatório. Para que este medicamento seja eficaz, é necessário estímulo sexual.



COMO CITRATO DE SILDENAFILA FUNCIONA?

Este medicamento atua favorecendo o relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos (principal estrutura erétil do pênis) e a dilatação das artérias que levam o sangue até eles, facilitando a entrada de sangue no pênis e consequentemente, favorecendo a ereção. Para que este medicamento seja eficaz, é necessário estímulo sexual.

APRESENTAÇÕES

- 25 mg c/2 comprimidos revestidos (1x2) - Reg. MS 1.2568.0261.002-5 - Cód.: 18287
- 25 mg c/4 comprimidos revestidos (1x4) - Reg. MS 1.2568.0261.003-3 - Cód.: 18288
- 50 mg c/1 comprimidos revestidos (1x1) - Reg. MS 1.2568.0261.031-9 - Cód.: 18289
- 50 mg c/2 comprimidos revestidos (1x2) - Reg. MS 1.2568.0261.032-7 - Cód.: 18290
- 50 mg c/4 comprimidos revestidos (1x4) - Reg. MS 1.2568.0261.033-5 - Cód.: 18291
- 50 mg c/8 comprimidos revestidos (2x4) - Reg. MS 1.2568.0261.034-3 - Cód.: 18742
- 50 mg c/60 comprimidos revestidos (6x10) - Reg. MS 1.2568.0261.052-1 - Cód.: 18297
- 100 mg c/2 comprimidos revestidos (1x2) - Reg. MS 1.2568.0261.062-9 - Cód.: 18293
- 100 mg c/4 comprimidos revestidos (1x4) - Reg. MS 1.2568.0261.063-7 - Cód.: 18294

Acesse a bula do produto:



Clonazepam

Solução e Comprimido

G Medicamento
Genérico

C Medicamento de
Controle especial

P Sabor
Pêssego

*1



Cód.: 13524 / 20ml

Cód.: 18671 / 3x10

Cód.: 18672/4x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

*1 - CLONAZEPAM SOLUÇÃO

REFERÊNCIA: RIVOTRIL - Produtos Roche Químicos e
Farmacêuticos S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA: Anticonvulsivantes

2 - CLONAZEPAM COMPRIMIDO

REFERÊNCIA: RIVOTRIL - Produtos Roche Químicos e
Farmacêuticos S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA: Anticonvulsivantes

Clonazepam

Solução

SABOR: PÊSSEGO



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTICONVULSIVANTES

USO ORAL – USO ADULTO E PEDIÁTRICO

ATENÇÃO! MEDICAMENTO CONTROLADO

MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL – LISTA B1

PARA QUE CLONAZEPAM É INDICADO?

Distúrbio epilético

Este medicamento é indicado para tratar crises epiléticas e espasmos infantis (Síndrome de West).

Este medicamento também é indicado para:

Transtornos de ansiedade

- Como ansiolítico em geral;

- Distúrbio do pânico com ou sem medo de espaços abertos;

- Fobia social (medo de situações como falar em público).

Transtornos do humor

- Transtorno afetivo bipolar (fases de depressão e mania): tratamento da mania;

- Depressão MARÇOr: associado a antidepressivos na depressão ansiosa e início do tratamento.

Síndromes psicóticas Acatisia (inquietação extrema, geralmente provocada por medicamentos psiquiátricos). Síndrome das pernas inquietas (desconforto ou dor nas pernas que leva a necessidade de movimentá-las, prejudicando o sono). Vertigem e distúrbios do equilíbrio:

náuseas, vômitos, desMARÇOs, quedas, zumbidos e distúrbios auditivos. Síndrome da boca ardente (sensação de queimação na parte interna da boca, sem alterações físicas).

COMO CLONAZEPAM FUNCIONA?

Clonazepam pertence à classe dos benzodiazepínicos, medicamentos que causam inibição leve do sistema nervoso, com consequente ação anticonvulsivante, sedativa leve, relaxante muscular e tranquilizante.

A ação deste medicamento oral dose única inicia em 30 a 60 minutos e se estende por 6 a 8 h em crianças e 8 a 12 h em adultos.

Comprimido

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTICONVULSIVANTES

USO ORAL – USO ADULTO E PEDIÁTRICO

ATENÇÃO! MEDICAMENTO CONTROLADO – MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL – LISTA B1

PARA QUE CLONAZEPAM É INDICADO?

Distúrbio epilético

Este medicamento é indicado para tratar crises epiléticas e espasmos infantis (Síndrome de West).

Este medicamento também é indicado para:

Transtornos de ansiedade

- Como ansiolítico em geral;

- Distúrbio do pânico com ou sem medo de espaços abertos;

- Fobia social (medo de situações como falar em público).

Transtornos do humor

- Transtorno afetivo bipolar (fases de depressão e mania): tratamento da mania;

- Depressão MARÇOr: associado a antidepressivos na depressão ansiosa e início do tratamento.

Síndromes psicóticas Acatisia (inquietação extrema, geralmente provocada por medicamentos psiquiátricos).

Síndrome das pernas inquietas (desconforto ou dor nas pernas que leva a necessidade de movimentá-las,

prejudicando o sono). Vertigem e distúrbios do equilíbrio: náuseas, vômitos, desMARÇOs, quedas, zumbidos e

distúrbios auditivos. Síndrome da boca ardente (sensação de queimação na parte interna da boca, sem alterações físicas).

COMO CLONAZEPAM FUNCIONA?

Clonazepam pertence à classe dos benzodiazepínicos, medicamentos que causam inibição leve do sistema nervoso, com consequente ação anticonvulsivante, sedativa leve, relaxante muscular e tranquilizante.

APRESENTAÇÕES

- 2,5 mg/ml solução 20 ml gotas - Reg. MS 1.2568.0230.001-8 - Cód.: 13524
- 2 mg c/30 comprimidos (3x10) - Reg. MS 1.2568.0270.010-5 - Cód.: 18671
- 2 mg c/60 comprimidos (4x15) - Reg. MS 1.2568.0270.011-3 - Cód.: 18672



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.



Acesse a bula do produto:



Acesse a bula do produto:



Cloridrato de Bupropiona

Comprimido Revestido de Liberação Prolongada

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita



Cód.: 19492/3x10

Cód.: 19494/6x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Zyban-GlaxoSmithKline Brasil LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA

Antitabágico.

Cloridrato de Bupropiona

Comprimido Revestido de Liberação Prolongada



CLASSE TERAPÊUTICA - ANTITABÁGICO

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE É INDICADO?

Este medicamento foi receitado pelo seu médico para ajudar você a parar de fumar. Este medicamento demonstrou funcionar bem tanto para fumantes recreativos quanto para aqueles que fumam muito, não importa há quanto tempo ou se já tentaram parar de fumar. Este medicamento também demonstrou funcionar como auxiliar na cessação tabágica em fumantes que apresentam certos tipos de doença pulmonar e cardíaca. Em estudos clínicos, um número significativo de pessoas conseguiu ficar livre do cigarro por até 12 meses enquanto tomava cloridrato de bupropiona. Para muitos pacientes, este medicamento reduziu os sintomas da Síndrome de abstinência e a vontade de fumar. Você precisa começar a usar cloridrato de bupropiona enquanto ainda estiver fumando e, junto com seu médico, determinar uma data para interromper o hábito durante a segunda semana após o início do tratamento.



COMO FUNCIONA?

Este é um medicamento que contém a substância ativa bupropiona. Esta substância é capaz de reduzir a vontade de fumar de pessoas com dependência à nicotina. Seu mecanismo de ação não é igual ao dos tratamentos de reposição de nicotina. Presume-se que este medicamento interage com duas substâncias químicas no cérebro, chamadas de noradrenalina e dopamina, que estão relacionadas com dependência e abstinência. O uso deste medicamento deve ser acompanhado por um programa de suporte. Este medicamento demora cerca de uma semana para começar a fazer efeito, já que é o período necessário para que a bupropiona atinja os níveis necessários no organismo. Este medicamento será mais eficiente se você estiver totalmente comprometido a parar de fumar e dispuser de um programa de suporte ou de aconselhamento para auxiliá-lo.

APRESENTAÇÕES

- 150 mg comprimido revestido de liberação prolongada (3x10) - Reg. MS 1.2568.0298.002-7 - Cód.: 19492
- 150 mg comprimido revestido de liberação prolongada (6x10) - Reg. MS 1.2568.0298.003-5 - Cód.: 19494

**Acesse a bula
do produto:**



Cloridrato de Ciclobenzaprina

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 20097/1x15

Cód.: 20098/2x15

Cód.: 20099/1x15

Cód.: 20100/2x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Miosan-Apsen Farmacêutica S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Relaxantes Musculares.

Cloridrato de Ciclobenzaprina

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
RELAXANTES MUSCULARES


USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de espasmos (contrações involuntárias) musculares associadas com condições musculoesqueléticas agudas e dolorosas, como as dores lombares, torcicolos, periartrite escapuloumeral (acomete o ombro), cervicobraquialgias (dores na região do pescoço que irradiam para os braços) e no tratamento da fibromialgia. Além disso, é indicado como coadjuvante de outras medidas para o alívio dos sintomas, tais como fisioterapia e repouso.

COMO FUNCIONA?

Este medicamento, cujo princípio ativo é o cloridrato de ciclobenzaprina, é um relaxante muscular. A ciclobenzaprina suprime o espasmo do músculo esquelético de origem local, sem interferir com a função muscular. A utilização de ciclobenzaprina por períodos superiores a duas ou três semanas deve ser feita com o devido acompanhamento médico, mesmo porque, em geral, os espasmos musculares associados às condições musculoesqueléticas agudas e dolorosas são de curta duração. A ciclobenzaprina é ineficaz em espasmos musculares secundários a doenças do sistema nervoso central. Tempo médio estimado para início da ação terapêutica: o medicamento tem início de ação em, aproximadamente, 1 hora após a administração.



**Acesse a bula
do produto:**



APRESENTAÇÕES

- 5 mg comprimido revestido (1x15) - Reg. MS 1.2568.0280.052-5 - Cód.: 20097
- 5 mg comprimido revestido (2x15) - Reg. MS 1.2568.0280.050-9 - Cód.: 20098
- 10 mg comprimido revestido (2x15) - Reg. MS 1.2568.0280.028-2 - Cód.: 20100
- 10 mg comprimido revestido (1x15) - Reg. MS 1.2568.0280.025-8 - Cód.: 20099

Cloridrato de Ciprofloxacino

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita

 **ATENÇÃO**
Antibiótico
Medicamento



Cód.: 13267 / 14x10

Cód.: 3916 / 1x14



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
CIPRO / Bayer S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antibióticos sistêmicos simples

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022

Cloridrato de Ciprofloxacino

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS SIMPLES**USO ORAL - USO ADULTO**
ATENÇÃO! ANTIBIÓTICO!

PARA QUE É INDICADO?

Adultos: para o tratamento de infecções complicadas e não complicadas causadas por micro-organismos sensíveis ao ciprofloxacino: do trato respiratório. Muitos dos micro-organismos, por exemplo *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Proteus*, *E. coli*, *Pseudomonas*, *Haemophilus*, *Moraxella*, *Legionella* e *Staphylococcus* reagem com muita sensibilidade ao cloridrato de ciprofloxacino. A maioria dos casos de pneumonia que não necessitam de tratamento hospitalar é causada por *Streptococcus pneumoniae*. Nesses casos, cloridrato de ciprofloxacino não é o medicamento de primeira escolha; do ouvido médio (otite média) e dos seios paranasais (sinusite), especialmente se causadas por *Pseudomonas* ou *Staphylococcus*; dos olhos; dos rins e/ou do trato urinário eferente; dos órgãos reprodutores, inclusive inflamação dos ovários e das tubas uterinas (anexite), gonorreia e infecções da próstata (prostatite); da cavidade abdominal, por exemplo do estômago e intestino (trato gastrointestinal), do trato biliar e da membrana serosa que reveste internamente as paredes do abdome (peritônio); da pele e de tecidos moles; dos ossos e articulações. Infecção generalizada (septicemia). Infecções ou risco de infecção (profilaxia) em pacientes com sistema imunológico comprometido, por exemplo, pacientes em tratamento com medicamentos que inibem as defesas imunológicas naturais do organismo ou pacientes com número reduzido de glóbulos brancos do sangue. Eliminação seletiva de bactérias do intestino durante tratamento com medicamentos que inibem o sistema imunológico do organismo. Descontaminação intestinal seletiva em pacientes sob tratamento com imunossupressores. Este medicamento não é eficaz contra *Treponema pallidum* (causador da sífilis). Crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos: para infecção aguda na fibrose cística (distúrbio hereditário que aumenta a produção e a viscosidade das secreções nos brônquios e no trato digestivo) causada por *P. aeruginosa* se não houver possibilidade de outros tratamentos injetáveis mais eficazes. Não se recomenda este medicamento para outras indicações. Antraz por inalação (após exposição) em adultos e crianças: para reduzir a incidência ou progressão da doença após inalação de bacilos de antraz (*Bacillus anthracis*).

COMO FUNCIONA?

O ciprofloxacino, componente ativo deste medicamento, pertence ao grupo das quinolonas. As quinolonas bloqueiam determinadas enzimas de bactérias que têm um papel fundamental no metabolismo e na reprodução bacteriana, matando as bactérias causadoras da doença.

APRESENTAÇÕES

- 500 mg c/ 14 comprimidos revestidos (1x14) - Reg. MS 1.2568.0150.007-2 - Cód.: 3916
- 500 mg c/ 140 comprimidos revestidos (14x10) - Reg. MS 1.2568.0150.012-9 - Cód.: 13267

Embalagem Fracionável

Acesse a bula do produto:

Cloridrato de Fluoxetina

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita



Cód.: 18920 / 2x15

Cód.: 18922 / 4x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

DAFORIN® - VER SIGMA PHARMA LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA

Antibióticos sistêmicos simples

FONTE:

IQVIA MAT MARÇO/2022

Cloridrato de Fluoxetina

Comprimido Revestido



CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIMICÓTICOS PARA USO TÓPICO

USO TÓPICO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento da depressão, associada ou não à ansiedade. Também é indicado para o tratamento da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), incluindo tensão pré-menstrual (TPM), irritabilidade e disforia (mal-estar provocado pela ansiedade).



COMO FUNCIONA?

Este medicamento aumenta os níveis de serotonina no cérebro, resultando em melhora dos sintomas da depressão, associada ou não à ansiedade, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno disfórico pré-menstrual.

A resposta terapêutica deste medicamento é observada algumas semanas após o início do tratamento. No entanto, se o paciente não apresentar melhora dos sintomas, o médico deverá avaliar e reajustar a dose utilizada.

Este medicamento é bem absorvido após administração oral. Concentrações plasmáticas máximas são alcançadas dentro de 6 a 8 horas.

APRESENTAÇÕES

- 20 mg c/ 30 comprimidos revestidos (2x15) - Reg. MS 1.2568.0283.005-1 - Cód.: 18920
- 20 mg c/ 30 comprimidos revestidos (4x15) - Reg. MS 1.2568.0283.022-1 - Cód.: 18922

**Acesse a bula
do produto:**



Cloridrato de Memantina

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

EBIX/Lundbeck Brasil LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos que atuam sobre o sistema nervoso

Cloridrato de Memantina

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – OUTROS PRODUTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO

Uso ORAL - Uso ADULTO

PARA QUE O CLORIDRATO DE MEMANTINA É INDICADO

Este medicamento é indicado para o tratamento da doença de Alzheimer moderada a grave.



COMO O CLORIDRATO DE MEMANTINA FUNCIONA?

A perda de memória associada à doença de Alzheimer deve-se a alterações na transmissão de sinais no cérebro. O cérebro contém receptores do tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) envolvidos na transmissão de sinais nervosos em áreas importantes para aprendizagem e memória. O cloridrato de memantina é um antagonista dos receptores NMDA; ele atua nestes receptores, melhorando a transmissão dos sinais nervosos e a memória.

APRESENTAÇÕES

10 mg comprimido revestido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0264.002-1
Cód.: 18618

10 mg comprimido revestido (6x10)
Reg. MS 1.2568.0264.003-1
Cód.: 18621

10 mg comprimido revestido (12x10)
Reg. MS 1.2568.0264.005-6
Cód.: 18622

Acesse a bula do produto:



Cloridrato de Metformina

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico



REFERÊNCIA

GLIFAGE / Merck S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Antidiabéticos



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Cloridrato de Metformina

Comprimido Revestido



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIDIABÉTICOS

USO ORAL – USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS

PARA QUE CLORIDRATO DE METFORMINA É INDICADO?

Este medicamento é um antidiabético de uso oral, que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2, isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulinoterapia. Este medicamento também está indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos, condição caracterizada por ciclos menstruais irregulares e frequentemente excesso de pelos e obesidade.



COMO CLORIDRATO DE METFORMINA FUNCIONA?

Este medicamento é utilizado para tratar o diabetes. A metformina pertence a um grupo de medicamentos denominados biguanidas. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que os tecidos do corpo absorvam a glicose (açúcar) do sangue e a usem para produzir energia ou armazená-la para uso posterior. Se você tem diabetes, o seu pâncreas não produz insulina suficiente ou o seu corpo não é capaz de utilizar adequadamente a insulina que produz. Isto leva a um nível elevado de glicose no sangue. Este medicamento ajuda a baixar o nível de glicose no sangue para um nível tão normal quanto possível. Em estudos clínicos, o uso de metformina foi associado à estabilização do peso corporal ou a uma modesta perda de peso.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÕES

- 500 mg c/ 30 comprimidos revestidos (3x10) - Reg. MS 1.2568.0151.004-3 - Cód.: 5169
- 500 mg c/ 60 comprimidos revestidos (6x10) - Reg. MS 1.2568.0151.020-5 - Cód.: 17449
- 850 mg c/ 30 Comprimidos revestidos (3x10) - Reg. MS 1.2568.0151.001-9 - Cód.: 5176
- 850 mg c/ 60 Comprimidos revestidos (6x10) - Reg. MS 1.2568.0151.018-3 - Cód.: 18914

Cloridrato de Metformina

Comprimido de Liberação Prolongada

G Medicamento Genérico

LIBERAÇÃO PROLONGADA



Cód.: 16242 / 3x10

Cód.: 16241 / 3x10

Cód.: 18913 / 6x10

APRESENTAÇÃO EXCLUSIVA

REFERÊNCIA: GLIFAGE XR / Merck S.A.
CLASSE TERAPÊUTICA: Antidiabéticos
FONTE: IQVIA MAT MARÇO/2022



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Cloridrato de Metformina

Comprimido de Liberação Prolongada

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIDIABÉTICOS

Uso ORAL – USO ADULTO

PARA QUE CLORIDRATO DE METFORMINA LP É INDICADO?

Este é um medicamento antidiabético de uso oral, que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2 em adultos, isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulinoterapia. Este medicamento também está indicado na síndrome dos ovários policísticos, condição caracterizada por ciclos menstruais irregulares e frequentemente excesso de pelos e obesidade.



COMO CLORIDRATO DE METFORMINA LP FUNCIONA?

Este medicamento contém metformina, um medicamento para tratar o diabetes em adultos. A metformina pertence a um grupo de medicamentos denominados biguanidas. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que os tecidos do corpo absorvam a glicose (açúcar) do sangue e a usem para produzir energia ou armazená-la para uso posterior. Se você tem diabetes, o seu pâncreas não produz insulina suficiente ou o seu corpo não é capaz de utilizar adequadamente a insulina que produz. Isto leva a um nível elevado de glicose no sangue. Este medicamento ajuda a baixar o nível de glicose no sangue para um nível tão normal quanto possível. Em estudos clínicos, o uso de metformina foi associado a estabilização do peso corporal ou a uma modesta perda de peso.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÕES

- 500 mg c/ 30 comprimidos de liberação prolongada (3x10) - Reg. MS 1.2568.0247.002-9 - Cód.: 16241
- 500 mg c/comprimidos de liberação prolongada (6x10) - Reg. MS 1.2568.0247.003-7 - Cód.: 18913
- 750 mg c/comprimidos de liberação prolongada (3x10) - Reg. MS 1.2568.0247.012-6 - Cód.: 16242

Cloridrato de Moxifloxacino

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita

ATENÇÃO
Antibiótico
Medicamento



Cód.: 20261 / 1x5

Cód.: 20262 / 1x7



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Avalox - Bayer S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Antibióticos sistêmicos simples.

Cloridrato de Moxifloxacino

Comprimido Revestido




CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS SIMPLES

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO É INDICADO?

O cloridrato de moxifloxacino é indicado para o tratamento de adultos (com idade igual ou acima de 18 anos) com: Infecções das vias respiratórias superiores e inferiores, exacerbações (pioras) agudas de bronquite crônica, pneumonia adquirida na comunidade (PAC) incluindo PAC causada por bactérias resistentes a alguns antibióticos*, sinusite aguda. Infecções não complicadas de pele e tecidos moles (camadas mais superficiais da pele). Doença inflamatória pélvica não complicada (isto é, doenças do trato genital superior feminino, inclusive infecção das trompas e do endométrio, que é a camada que reveste o interior do útero). Infecções complicadas de pele e anexos (incluindo infecções do pé diabético). Infecções intra-abdominais complicadas, incluindo infecções causadas por várias bactérias, como abscessos.

**Streptococcus pneumoniae* multirresistentes, incluindo isolados conhecidos como *S. pneumoniae* resistente a penicilina e cepas resistentes a dois ou mais dos seguintes antibióticos: penicilina (CIM $\geq 2 \mu\text{g/mL}$), cefalosporinas de 2ª geração (por exemplo, cefuroxima), macrolídeos, tetraciclina e trimetoprima/sulfametoxazol. Devem-se considerar as recomendações relacionadas ao uso apropriado de agentes antibióticos.



COMO O CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO FUNCIONA?

Este medicamento é um antibiótico utilizado para tratar infecções causadas por uma variedade de bactérias. Atua causando a morte das bactérias interferindo nas enzimas que controlam a multiplicação das bactérias. Desde que adequadamente indicado, os sinais e os sintomas da doença devem melhorar em um período mínimo de cinco dias de tratamento correto.

APRESENTAÇÕES

400 mg comprimido
revestido (1x5)
Reg. MS 1.2568.0284.001-2
Cód.:20162

400 mg comprimido
revestido (1x7)
Reg. MS 1.2568.0284.002-0
Cód.: 20262

**Acesse a bula
do produto:**



Cloridrato de Ondansetrona

Comprimido Orodispersível

G Medicamento Genérico



Medicamento com Retenção de receita

Cód.: 23863 / 1x10



Cód.: 23864 / 1x10



Cód.: 23784 / 3x10

Cód.: 23783 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

MEDICAMENTO REFERÊNCIA

VONAU FLASH® – BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA

Antieméticos e Antinauseantes

Cloridrato de Ondansetrona

Comprimido Orodispersível

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

Uso ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O CLORIDRATO DE ONDANSETRONA É INDICADO?

É indicado para prevenir e tratar náuseas e vômitos.



COMO O CLORIDRATO DE ONDANSETRONA FUNCIONA?

A substância ativa deste medicamento é a ondansetrona. O mecanismo de ação dessa substância não foi completamente caracterizado. A ação do medicamento inicia-se aproximadamente 1 hora e meia após a ingestão.

APRESENTAÇÕES

- 4 mg c10 comprimidos orodispersíveis (1x10) - Reg. MS 1.2568.0332.001-2 - Cód.: 23863
- 4 mg c30 comprimidos orodispersíveis (3x10) - Reg. MS 1.2568.0332.002-0 - Cód.: 23783
- 8 mg c10 comprimidos orodispersíveis (1x10) - Reg. MS 1.2568.0332.004-7 - Cód.: 23864
- 8 mg c30 comprimidos orodispersíveis (3x10) - Reg. MS 1.2568.0332.005-5 - Cód.: 23784

Acesse a bula do produto:



Cloridrato de Paroxetina

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita



Cód.: 18663 / 2x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

AROPAX - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA

Antidepressivos

Cloridrato de Paroxetina

Comprimido Revestido



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIDEPRESSIVOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O CLORIDRATO DE PAROXETINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de ADULTOS que apresentam algumas das condições abaixo:

- transtorno depressivo maior (mesmo que, anteriormente, outros antidepressivos não tenham sido eficazes);
- comportamento obsessivo ou compulsivo (incontrolado);
- ataques de pânico, inclusive os causados por fobia (pavor) de lugares abertos (agorafobia);
- ansiedade generalizada (sensação de muita ansiedade ou nervosismo em situações rotineiras), inclusive em situações que exigem contato social;
- ansiedade seguida de evento traumático (transtorno de estresse pós-traumático): acidente de carro, assalto ou desastre natural, como enchente ou terremoto.

Cloridrato de paroxetina não é indicado para o tratamento de crianças e adolescentes menores de 18 anos (vide **Crianças e Adolescentes Menores de 18 Anos, em O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**).

COMO O CLORIDRATO DE PAROXETINA FUNCIONA?

Cloridrato de paroxetina eleva os níveis de uma substância produzida pelo cérebro, a serotonina

(5-hidroxitriptamina, ou 5-HT). Cloridrato de paroxetina pertence a uma classe de medicamentos chamados de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS). Assim como outras substâncias dessa classe, pode não eliminar os sintomas imediatamente. Os pacientes, de modo geral, se sentem melhor algumas semanas após o início do tratamento. Às vezes os sintomas de depressão e outros transtornos psiquiátricos provocam pensamento e/ou comportamento suicida. É possível que esses sintomas continuem ou aumentem até que o antidepressivo alcance sua ação completa. Informe seu médico imediatamente ou procure o hospital mais próximo caso ocorra algum pensamento ou comportamento estressante durante o início do tratamento ou em qualquer outra fase enquanto você estiver tomando este medicamento. Avise também seu médico se você apresentar qualquer piora da depressão ou se novos sintomas surgirem durante o tratamento.



APRESENTAÇÕES

20 mg comprimido revestido (2x15)
Reg. MS 1.2568.0266.002-2
Cód.:18663

Acesse a bula do produto:



Cloridrato de Prometazina

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico



Cód.: 23286 / 1x20



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

FENERGAN® – SANOFI-MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA

Anti-Histamínico Sistêmico

Cloridrato de Prometazina

Comprimido Revestido



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HISTAMÍNICO SISTÊMICO

Uso ORAL - Uso ADULTO

PARA QUE O CLORIDRATO DE PROMETAZINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado no tratamento dos sintomas das reações anafiláticas (reação rápida e progressiva a uma substância) e reações alérgicas. Graças à sua atividade antiemética (proporciona alívio de náuseas e vômitos) é utilizado também na prevenção de vômitos do pós-operatório e dos enjoos de viagens. Pode ser utilizado, ainda, na pré-anestesia e na potencialização de analgésicos, devido à sua ação sedativa (calmante).



COMO O CLORIDRATO DE PROMETAZINA FUNCIONA?

Este medicamento pertence a um grupo de medicamentos chamados anti-histamínicos, os quais apresentam em comum a propriedade de se opor aos efeitos de uma substância natural chamada histamina que é produzida pelo organismo durante uma reação alérgica, principalmente na pele, nos vasos e nas mucosas (conjuntival, nasal, brônquica e intestinal). Os efeitos clínicos deste medicamento são notados dentro de 20 minutos após a administração e geralmente duram de 4 a 6 horas, embora possam persistir até por 12 horas.

APRESENTAÇÕES

25 mg comprimido revestido (1x20)
Reg. MS 1.2568.0333.001-8
Cód.:23286

**Acesse a bula
do produto:**



Cloridrato de Propafenona

Comprimido revestido

G Medicamento Genérico



Cód.: 16970 / 3x10

Cód.: 16972 / 6x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

RITMONORM / Abbot Laboratórios do Brasil Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA

Antiarrítmicos

Cloridrato de Propafenona

Comprimido revestido




CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIARRÍTMICOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O CLORIDRATO DE PROPAFENONA É INDICADO?

Este medicamento é destinado para tratamento das alterações do ritmo cardíaco (coração). O medicamento é um agente antiarrítmico com efeito estabilizador de membrana na célula muscular do coração.



COMO O CLORIDRATO DE PROPAFENONA FUNCIONA?

Este medicamento é um agente que atua de forma a inibir ou diminuir as irregularidades no ritmo ou mudança na frequência dos batimentos cardíacos, com efeito estabilizador de membrana na célula muscular do coração. O tempo médio estimado para o início da ação farmacológica no organismo é de aproximadamente 3 horas após a administração oral.

APRESENTAÇÕES

300 mg c/ 30 comprimidos revestidos (3x10)

Reg. MS 1.2568.0255.022-7

Cód.: 16970

300 mg c/ 60 comprimidos revestidos (6x10)

Reg. MS 1.2568.0255.023-5

Cód.: 16972

**Acesse a bula
do produto:**



Cloridrato de Sertralina

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita



Cód.: 19152/3x10

Cód.: 19153/3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

ZOLOFT/Laboratórios Pfizer Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Antidepressivos

Cloridrato de Sertralina

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA ANTIDEPRESSIVOS

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

PARA QUE O CLORIDRATO DE SERTRALINA É INDICADO?

Cloridrato de sertralina é indicado para o tratamento da depressão acompanhada por sintomas de ansiedade, do transtorno obsessivo compulsivo em adultos e crianças acima de 6 anos de idade, do transtorno do pânico, do transtorno do estresse pós-traumático, da fobia social ou transtorno da ansiedade social e da síndrome da tensão pré-menstrual e/ou transtorno disfórico pré-menstrual.



COMO O CLORIDRATO DE SERTRALINA FUNCIONA?

Este medicamento age sobre uma substância encontrada no cérebro, chamada de serotonina, aumentando sua disponibilidade e com isso aliviando os sintomas depressivos e ansiosos, típicos dos transtornos para os quais é indicado. Cloridrato de sertralina começa a agir em 7 dias. O tempo necessário para se observar melhora clínica pode variar e depende das características do paciente e do tipo de transtorno em tratamento.

APRESENTAÇÕES

50 mg comprimido revestido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0271.003-8
Cód.: 19152

100 mg comprimido revestido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0271.015-1
Cód.: 19153

Acesse a bula do produto:



Cloridrato de Terbinafina

Comprimido

G Medicamento Genérico



Cód.: 18885 / 2x14

Cód.: 6864 / 1x14



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
LAMISIL/ Novartis Biociências S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antimicóticos

Cloridrato de Terbinafina

Comprimido

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIMICÓTICOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O CLORIDRATO DE TERBINAFINA É INDICADO?

Tratamento de onicomicoses e infecções fúngicas da pele.

COMO O CLORIDRATO DE TERBINAFINA FUNCIONA?

Este medicamento apresenta como componente ativo a substância cloridrato de terbinafina que pertence ao grupo dos medicamentos chamados de agentes antifúngicos. Este medicamento trata infecções fúngicas das unhas das mãos e dos pés, infecções por tinha (micose) do couro cabeludo e do cabelo, virilha e outras áreas do corpo e os pés (pé de atleta), bem como infecções fúngicas da pele.

APRESENTAÇÕES


250 mg c/ 14 comprimidos (1x14)
Reg. MS 1.2568.0198.002-3
Cód.: 6864

250 mg c/ 28 comprimidos (2x14)
Reg. MS 1.2568.0198.003-1
Cód.: 18885



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.



Acesse a bula do produto:



Cloridrato de Tetraciclina

Cápsula Dura

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

ATENÇÃO
Antibiótico
Medicamento

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**

Cód.: 21594 / 25x4



Cód.: 4707 / 1x12

Cód.: 12125 / 14x10

REFERÊNCIA
Genérico Prati-Donaduzzi

CLASSE TERAPÊUTICA
Antibióticos sistêmicos simples

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Cloridrato de Tetraciclina

Cápsula Dura

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS SIMPLES

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O CLORIDRATO DE TETRACICLINA É INDICADO?

O cloridrato de tetraciclina cápsula é indicado no tratamento de infecções causadas por micro-organismos sensíveis à tetraciclina.

COMO O CLORIDRATO DE TETRACICLINA FUNCIONA?

O cloridrato de tetraciclina pertence à classe das tetraciclinas, que são agentes bacteriostáticos, ou seja, inibem o desenvolvimento de bactérias. Este medicamento tem ação sobre um amplo número de micro-organismos e age inibindo a síntese de proteínas das bactérias sensíveis.

APRESENTAÇÕES

500 mg c/ 12 cápsulas duras (1x12)
Reg. MS 1.2568.0171.002-6
Cód.: 4707


500 mg c/ 140 cápsulas duras (14x10)
Reg. MS 1.2568.0171.006-9
Cód.: 12125 - Embalagem Fracionável

500 mg c/ 100 cápsulas duras (10x10)
Reg. MS 1.2568.0171.003-4
Cód.: 21594



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.



**Acesse a bula
do produto:**



Cloridrato de Tramadol

Cápsula Dura

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita



Cód.: 19870/ 1x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
Tramal® - Grünenthal do Brasil Farmacêutica LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA
Analgésico Narcótico

Cloridrato de Tramadol

Cápsula Dura

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
ANALGÉSICO NARCÓTICO


USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

PARA QUE O CLORIDRATO DE TRAMADOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o alívio da dor de intensidade moderada a grave.

COMO O CLORIDRATO DE TRAMADOL FUNCIONA?

Este medicamento é um analgésico que pertence à classe dos opioides que age no sistema nervoso central. Desta forma alivia a dor agindo nas células nervosas específicas da medula espinhal e cérebro.



Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÃO

50 mg cápsula dura
Reg. MS 1.2568.0310.001-2
Cód.: 19870

Diclofenaco Sódico

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 7437 / 1x20



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Voltaren - Novartis Biociências S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Anti-inflamatórios

Diclofenaco Sódico

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-INFLAMATÓRIOS


USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O DICLOFENACO SÓDICO É INDICADO?

Este medicamento pode ser utilizado no tratamento das seguintes condições: Dor reumática ou degenerativa das articulações (artrite); Dor nas costas, síndrome do ombro congelado, cotovelo de tenista, e outros tipos de reumatismo; Crises de gota; Entorses, distensões e outras lesões; Dor e inchaço após a cirurgia; Condições inflamatórias dolorosas em ginecologia, incluindo períodos menstruais; Infecções do ouvido, nariz e garganta.

COMO O DICLOFENACO SÓDICO FUNCIONA?

Este medicamento pertence a um grupo de medicamentos chamados anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), usados para tratar dor e inflamação. Este medicamento alivia os sintomas da inflamação, tais como inchaço e dor, bloqueando a síntese de moléculas (prostaglandinas) responsáveis pela inflamação, dor e febre.



APRESENTAÇÃO

50 mg comprimido revestido 1x20

Reg. MS 1.2568.0200.001-4

Cód.: 7437

Acesse a bula do produto:



Dicloridrato de Betaistina

Comprimido

G Medicamento Genérico

APRESENTAÇÃO EXCLUSIVA



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Betaserc - Abbott Laboratórios do Brasil Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA

Vasodilatadores

FONTE:

IQVIA MAT MARÇO/2022

Dicloridrato de Betaistina

Comprimido



CLASSE TERAPÊUTICA – VASODILATADORES

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE DICLORIDRATO DE BETAISTINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para:

- Síndrome de Ménière, caracterizada por 3 (três) principais sintomas: vertigem (sensação de tontura com mal estar acompanhado de náusea ou vômito), zumbido nos ouvidos e perda ou dificuldade de audição.
- Sensação de tontura: causada quando uma parte do seu ouvido interno que controla o seu equilíbrio não está funcionando corretamente (chamada "vertigem vestibular").



COMO DICLORIDRATO DE BETAISTINA FUNCIONA?

Este medicamento contém betaistina, é um tipo de medicamento chamado “análogo-histamínico” e age melhorando o fluxo sanguíneo no seu ouvido interno. Isso diminui o acúmulo da pressão. Este medicamento melhora os sintomas de vertigem (acompanhada de náuseas e vômitos) e zumbido no ouvido. A melhora, algumas vezes, só pode ser observada após algumas semanas de tratamento. Os melhores resultados são obtidos às vezes depois de alguns meses. Existem evidências que o tratamento desde o início da doença previne a sua progressão e/ou a perda de audição em fases avançadas da doença.

APRESENTAÇÕES

- 16 mg c/30 comprimidos revestidos (3x10) - Reg. MS 1.2568.0259.003-2 - Cód.: 17907
- 16 mg c/60 comprimidos revestidos (6x10) - Reg. MS 1.2568.0259.004-0 - Cód.: 17940
- 24 mg c/30 comprimidos revestidos (3x10) - Reg. MS 1.2568.0259.013-1 - Cód.: 17908
- 24 mg c/60 comprimidos revestidos (6x10) - Reg. MS 1.2568.0259.014-8 - Cód.: 17941

Acesse a bula do produto:



Dicloridrato de Pramipexol

Comprimido

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 18614/3x10

Cód.: 18560/3x10

Cód.: 18625/3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
SIFROL/ Boehringer Ingelheim Brasil Química e
Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antiparkinsonianos

Dicloridrato de Pramipexol

Comprimido



CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIPARKINSONIANOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE O DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento dos sinais e sintomas da doença de Parkinson sem causa conhecida, podendo ser usado isoladamente ou em associação com levodopa. Também é indicado para tratamento dos sintomas da Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) sem causa conhecida.



COMO O DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL FUNCIONA?

Este medicamento atua no cérebro aliviando os problemas motores relacionados com a doença de Parkinson e também protege os neurônios dos efeitos nocivos da levodopa. Ainda não se conhece o mecanismo de ação sobre a Síndrome das Pernas Inquietas (SPI).

APRESENTAÇÕES

0,125 mg comprimido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0274.002-6
Cód.: 18614

0,25 mg comprimido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0274.008-5
Cód.: 18560

1 mg comprimido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0274.014-1
Cód.: 18625

**Acesse a bula
do produto:**



Digoxina

Elixir

G Medicamento
Genérico

ATENÇÃO
CONTÉM AÇÚCAR

Sabor
Damasco

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**



Cód.: 91 / 60ml



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
DIGOXINA / Aspen Pharma

CLASSE TERAPÊUTICA
Glicosídeos cardíacos

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022

Digoxina

Elixir

SABOR: DAMASCO




CLASSE TERAPÊUTICA
GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR

PARA QUE DIGOXINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva (um conjunto de sinais e sintomas decorrentes do mau funcionamento do coração, que não é capaz de bombear o sangue e suprir a necessidade de oxigênio e nutrientes do organismo) e de certas arritmias, nome que se dá às variações do ritmo dos batimentos do coração.



COMO DIGOXINA FUNCIONA?

A digoxina pertence a um grupo de medicamentos chamados glicosídeos cardíacos. Esses medicamentos aumentam a força de contração do músculo do coração e por isso são usados para tratar certos problemas, como insuficiência cardíaca e irregularidade do ritmo dos batimentos do coração.

APRESENTAÇÃO

0,05 mg/ml elixir 60 ml
Reg. MS 1.2568.0092.001-9
Cód.: 91



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

**Acesse a bula
do produto:**



Dvitta

Colecalciferol [Vitamina D³] - Cápsula Mole

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.



Cód.: 20452/3x10

Cód.: 20457/1x4



Cód.: 20453/1x4

Cód.: 20454/1x8

Cód.: 20455/1x10

Cód.: 20456/3x10

Dvitta



Colecalciferol [Vitamina D³] - Cápsula Mole

CLASSE TERAPÊUTICA
VITAMINA D E ANÁLOGOS

USO ORAL
USO ADULTO

PARA QUE DVITTA É INDICADO?

Dvitta é um medicamento à base de colesteciferol (vitamina D3) indicado para prevenção e tratamento auxiliar na desmineralização óssea pré e pós-menopausa, na prevenção da formação inadequada dos ossos (raquitismo), em casos de osteomalácia e osteoporose e na prevenção no risco de quedas e fraturas.



COMO DVITTA FUNCIONA?

Dvitta atua regulando positivamente o processamento e a fixação do cálcio no organismo, processo fundamental para a mineralização óssea. É essencial para promover a absorção e utilização de cálcio e fosfato, e para a calcificação normal dos ossos. O início da ação da vitamina D após a ingestão de uma dose ocorre entre o período de 10 a 24 horas.

APRESENTAÇÕES

- Dvitta 5.000 UI 30 Caps (3x10) - Reg. MS 1.2568.0295.003-9 - Cód.: 20452
- Dvitta 7.000 UI 4 Caps (1x4) - Reg. MS 1.2568.0295.004-7 - Cód.: 20453
- Dvitta 7.000 UI 8 Caps (1x8) - Reg. MS 1.2568.0295.005-5 - Cód.: 20454
- Dvitta 7.000 UI 10 Caps (1x10) - Reg. MS 1.2568.0295.006-3 - Cód.: 20455
- Dvitta 7.000 UI 30 Caps (3x10) - Reg. MS 1.2568.0295.007-1 - Cód.: 20456
- Dvitta 50.000 UI 4 Caps (1x4) - Reg. MS 1.2568.0295.008-1 - Cód.: 20457

Comprimido Revestido

prati donaduzzi

finasterida

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

comprimido revestido 1 mg

contém 30 comprimidos revestidos

G Medicamento Genérico

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

USO ORAL - USO ADULTO

prati donaduzzi

finasterida

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

comprimido revestido 1 mg

contém 60 comprimidos revestidos

G Medicamento Genérico

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

USO ORAL - USO ADULTO

prati donaduzzi

Este medicamento contém 1 mg de finasterida por comprimido revestido.

Informações ao paciente, indicações, contraindicações e precauções vide bula.


Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz e umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

PREVENIR O USO INDEBIDO

PREVENIR O USO INDEBIDO

Cód.:20094/3x10



Inibidor da Alfa-Redutase

Finasterida

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA

INIBIDOR DA ALFA-REDUTASE

USO ORAL

USO ADULTO




PARA QUE A FINASTERIDA É INDICADA?

Seu médico prescreveu este medicamento porque você tem calvície de padrão masculino (também conhecida como alopecia androgênica). Este medicamento aumenta o crescimento capilar no couro cabeludo e previne a queda de cabelo adicional em homens. Este medicamento é indicado para uso apenas em homens e não deve ser utilizado por mulheres ou crianças.

COMO A FINASTERIDA FUNCIONA?

No couro cabeludo, este medicamento reduz especificamente os níveis de diidrotestosterona (DHT), a causa principal de queda de cabelo de padrão masculino. Desta maneira, este medicamento ajuda a reverter o processo da calvície, levando ao aumento do crescimento capilar e à prevenção de perdas adicionais de cabelo.



APRESENTAÇÕES

1 mg comprimido revestido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0281.002-4
Cód.: 20094

1 mg comprimido revestido (6x10)
Reg. MS 1.2568.0281.003-2
Cód.: 20096

Acesse a bula do produto:



Fluconazol

Cápsula Dura

G Medicamento
Genérico



Cód.:7029/1x2

Cód.: 12401/9x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

ZOLTEC – LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA

Antimicóticos Sistêmicos de Uso Oral

Fluconazol

Cápsula Dura

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIMICÓTICOS SISTÊMICOS
DE USO ORAL

USO ORAL
USO ADULTO

PARA QUE O FLUCONAZOL É INDICADA?

Este medicamento é indicado para o tratamento de candidíase vaginal (infecções da vagina causadas por fungos do gênero *Candida*) aguda e recorrente (de repetição), como profilaxia (prevenção) para reduzir a candidíase vaginal recorrente (três ou mais episódios por ano), balanite por *Candida* (infecção fúngica da região conhecida popularmente como “cabeça do pênis”) e dermatomicoses (infecções fúngicas na pele e nos seus anexos, por exemplo, unha, conhecidas popularmente como micoses) como: *Tinea pedis*, *Tinea corporis*, *Tinea cruris*, *Tinea unguium* (onicomicoses) e infecções por fungos do gênero *Candida*.



COMO O FLUCONAZOL FUNCIONA?

Este medicamento impede o crescimento de fungos por inibir que esses microrganismos sintetizem compostos (esteroides) necessários à sua sobrevivência. É bem absorvido por via oral (engolido), a absorção não é afetada pela ingestão juntamente a alimentos e atinge os níveis no sangue de 0,5 hora (meia hora) a 1,5 hora.

APRESENTAÇÕES

150mg cápsula dura (1x2)
Reg. MS 1.2568.0199.002-9
Cód.: 7029

150 mg cápsula dura (9x10)
Reg. MS 1.2568.0199.009-6
Cód.: 12401

**Acesse a bula
do produto:**



Fosfato Sódico de Prednisolona

Solução Oral 1 mg/ml

G Medicamento
Genérico

**NÃO CONTÉM
AÇÚCAR**

Acompanha
**Seringa
Dosadora**



Cód.: 8735 / 100ml

Cód.: 8736 / 120ml

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA: PREDNISOLON / Aventis Pharma Ltda
CLASSE TERAPÊUTICA: Glicocorticóides sistêmicos

FONTE: IQVIA MAT MARÇO/2022

Fosfato Sódico de Prednisolona

Solução Oral 1 mg/ml

**ATENÇÃO**


Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – GLICOCORTICÓIDES SISTÊMICOS

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1MG/ML É INDICADO?

Este medicamento é indicado para tratamento de doenças endócrinas, reumáticas, dermatológicas, alérgicas, doenças respiratórias entre outras sensíveis aos corticosteroides.



COMO FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1MG/ML FUNCIONA?

Este medicamento é um glicocorticoide (corticoide) sintético. Este medicamento possui a prednisolona como princípio ativo que é um potente agente terapêutico com atividade anti-inflamatória muito eficaz. Tempo médio de início de ação: o fosfato sódico de prednisolona apresenta uma rápida absorção pelo trato digestório, entretanto, pela sua ampla aplicação terapêutica e dose variável, o tempo de início de ação pode variar conforme a patologia e dose utilizada.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÕES

- 1 mg/ml solução oral 100 ml + seringa dosadora - Reg. MS 1.2568.0082.007-3 - Cód.: 8735
- 1 mg/ml solução oral 120 ml + seringa dosadora - Reg. MS 1.2568.0082.008-1 - Cód.: 8736

Fosfato Sódico de Prednisolona

Solução Oral 3mg/ml

G Medicamento Genérico

NÃO CONTÉM AÇÚCAR

Acompanha
Seringa
Dosadora



Cód.: 6410 / 60ml

Cód.: 6409 / 120ml

Cód.: 6406 / 100ml

APRESENTAÇÃO EXCLUSIVA

REFERÊNCIA: PRELONE / Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CLASSE TERAPÊUTICA: Glicocorticóides Sistêmicos
FONTE: IQVIA MAT MARÇO/2022



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Fosfato Sódico de Prednisolona

Solução Oral 3mg/ml

**ATENÇÃO**


Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – GLICOCORTICÓIDES SISTÊMICOS

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML É INDICADO?

O fosfato sódico de prednisolona é indicado para o tratamento de distúrbios endócrinos, distúrbios reumáticos, doenças do sangue, doenças de pele, alergias, processos alérgicos ou inflamatórios nos olhos, doenças respiratórias, doenças neoplásicas, retenção de líquido, doenças gastrintestinais, doenças neurológicas e outros distúrbios.



COMO FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FUNCIONA?

O fosfato sódico de prednisolona é um glicocorticoide que pode reproduzir alguns efeitos dos hormônios adrenocorticais-endógenos. Este medicamento influencia o comportamento bioquímico da maioria dos tecidos do organismo, possuindo atividade glicocorticoide e anti-inflamatória.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÕES

- 3 mg/ml solução oral 60 ml + seringa dosadora - Reg. MS 1.2568.0129.021-3 - Cód.: 6410
- 3 mg/ml solução oral 100 ml + seringa dosadora - Reg. MS 1.2568.0129.017-5 - Cód.: 6406
- 3 mg/ml solução oral 120 ml + seringa dosadora - Reg. MS 1.2568.0129.019-1 - Cód.: 6409

Fumarato de Cetotifeno

Xarope

G Medicamento Genérico

 Acompanha Copo Medida

 Sabor Tutti-Frutti



Cód.: 13520 / 120ml



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

ZADITEN / Valeant Farmacêutica

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros medicamentos antiasmáticos

Fumarato de Cetotifeno

Xarope



SABOR TUTTI-FRUTTI



CLASSE TERAPÊUTICA – OUTROS MEDICAMENTOS ANTIASMÁTICOS


USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

ACIMA DE 6 MESES.

PARA QUE FUMARATO DE CETOTIFENO É INDICADO?

Este medicamento é indicado na prevenção de asma brônquica, quando associada com sintomas alérgicos. É utilizado na redução da frequência e da severidade de ataques, mas não cessa uma crise que já se iniciou. Este

medicamento não deve substituir outros tratamentos para problemas respiratórios na asma (por exemplo, corticosteroides). Este medicamento é também indicado na prevenção e no tratamento de distúrbios alérgicos tais como urticária, dermatite, rinite alérgica e conjuntivite.



COMO FUMARATO DE CETOTIFENO FUNCIONA?

Este medicamento tem como substância ativa o cetotifeno, antiasmático que inibe os efeitos de certas substâncias inflamatórias, como histamina e leucotrienos, o desenvolvimento da hiperatividade das vias aéreas causada pela ativação neural que se segue após a administração de alguns medicamentos ou quando o paciente foi exposto a alguma substância alergênica e também suprime a entrada de eosinófilos nos locais de inflamação. O cetotifeno é uma substância antialérgica potente porque possui propriedades bloqueadoras da histamina. Na prevenção da asma brônquica pode levar várias semanas para o tratamento atingir o efeito terapêutico esperado. Os principais efeitos deste medicamento ocorrem após duas a quatro semanas de tratamento devido ao retardo do início da ação. Seis a doze semanas de tratamento são necessárias para um efeito profilático máximo. Por isso, para pacientes que não respondam adequadamente dentro de algumas semanas, é recomendado que o tratamento com este medicamento seja mantido por um mínimo de 2 a 3 meses.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÕES

• 0,2 mg/ml xarope 120 ml - Reg. MS 1.2568.0233.003-0 - Cód.: 13520

Furosemida

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 19888/1x20



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
LASIX – AVENTIS PHARMA LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA
Diuréticos Simples

Furosemida

Comprimido

**ATENÇÃO**


Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – DIURÉTICOS SIMPLES

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE A FUROSEMIDA É INDICADA?

Este medicamento é indicado nos casos de: hipertensão arterial leve a moderada; edema (inchaço) devido a distúrbios do coração, do fígado e dos rins; edema devido a queimaduras.



COMO A FUROSEMIDA FUNCIONA?

Este medicamento apresenta efeito diurético (promove a excreção da urina) e anti-hipertensivo (auxilia no tratamento da pressão alta). O início da ação ocorre cerca de 60 minutos após a administração do produto.

APRESENTAÇÃO

40 mg comprimido (1x20)

Reg. MS 1.2568.0195.001-9

Cód.: 19888

Acesse a bula do produto:



Gabapentina

Cápsula Dura

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**



Cód.: 14489 / 3x10

Cód.: 14490 / 6x10

Cód.: 14492 / 3x10

Cód.: 14493 / 6x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
NEURONTIN - Laboratórios Pfizer Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Anticonvulsivantes

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022

Gabapentina

Cápsula Dura



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTICONVULSIVANTES

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS (APENAS PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA)
MEDICAMENTO CONTROLADO PORTARIA 344/98 LISTA C1

PARA QUE GABAPENTINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para: tratamento da dor neuropática (dor devido à lesão e/ou mau funcionamento dos nervos e/ou do sistema nervoso) em adultos; como monoterapia (uso apenas de gabapentina) e terapia adjunta das crises epilépticas parciais (convulsões), com ou sem generalização secundária (crise com MARÇOr comprometimento do sistema nervoso central acompanhada de perda da consciência), em pacientes a partir de 12 anos de idade.



COMO GABAPENTINA FUNCIONA?

Supõe-se que este medicamento atue modulando (regulando) o trânsito das mensagens entre as células do sistema nervoso, reduzindo a atividade excitatória responsável pela dor neuropática e pelas crises convulsivas. No entanto o seu mecanismo não é totalmente conhecido.

APRESENTAÇÕES

- Gabapentina 300 mg c/30 cápsulas duras (3x10) - Reg. MS 1.2568.0238.002-1 - Cód.: 14489
- Gabapentina 300 mg c/60 cápsulas duras (6x10) - Reg. MS 1.2568.0238.003-8 - Cód.: 14490
- Gabapentina 400 mg c/30 cápsulas duras (3x10) - Reg. MS 1.2568.0238.008-9 - Cód.: 14492
- Gabapentina 400 mg c/60 cápsulas duras (6x10) - Reg. MS 1.2568.0238.009-7 - Cód.: 14493

**Acesse a bula
do produto:**



Ginkgo Vital

Ginkgo Biloba
comprimido revestido

S Medicamento
Similar

 **Fitoterápico**



Cód.: 14304 / 3x10

Cód.: 14305 / 6x10

Cód.: 14306 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
Fitoterápico simples

Ginkgo Vital

Ginkgo Biloba comprimido revestido



CLASSE TERAPÊUTICA – FITOTERÁPICO SIMPLES

Uso ORAL - USO ADULTO

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

PARA QUE GINKGO VITAL É INDICADO?

Desordens e sintomas decorrentes da deficiência do fluxo sanguíneo cerebral como problemas de memória, função cognitiva, tonturas, dor de cabeça, vertigem, zumbidos, estágios iniciais de demências (como Alzheimer e demências mistas), além de distúrbios circulatórios periféricos (claudicação intermitente) e problemas na retina.



COMO GINKGO VITAL FUNCIONA?

Aumenta o fluxo sanguíneo, com consequente melhora de oferta de oxigênio para as células, protegendo os tecidos dos danos da falta de oxigênio (hipóxia), além de inibir a agregação plaquetária. Seu médico é a pessoa mais adequada para lhe dar maiores informações sobre o tratamento, siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas.

APRESENTAÇÕES

- 80 mg c/30 comprimidos revestidos (3x10) - Reg. MS 1.2568.0236.017- 7 - Cód.: 14304
- 80 mg c/60 comprimidos revestidos (6x10) - Reg. MS 1.2568.0236.018-5 - Cód.: 14305
- 120 mg c/30 comprimidos revestidos (3x10) - Reg. MS 1.2568.0236.027-4 - Cód.: 14306

**Acesse a bula
do produto:**



Glimepirida

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 20534/ 3x10

Cód.: 20535/ 3x10

Cód.: 20536/ 3x10

Glibenclamida

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 5514 / 1x30

1 - GLIMEPIRIDA - COMPRIMIDO

REFERÊNCIA: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA: Antidiabéticos

2 - GLIBENCLAMIDA - COMPRIMIDO

REFERÊNCIA: DAONIL / Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA: Antidiabéticos



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Glimepirida

Comprimido

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIDIABÉTICOS
USO ORAL - USO ADULTO



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

PARA QUE A GLIMEPIRIDA É INDICADA?

Este medicamento é indicado para o tratamento oral de diabetes mellitus não insulino-dependente (Tipo 2 ou diabetes do adulto), quando os níveis de glicose não podem ser adequadamente controlados por meio de dieta alimentar, exercícios físicos e redução de peso. Este medicamento pode ser associado a outros antidiabéticos orais que não estimulam a secreção de insulina, como a metformina. Este medicamento pode ser associado à metformina quando os níveis glicêmicos (níveis de açúcar no sangue) não podem ser adequadamente controlados por meio de dieta alimentar, exercícios físicos e uso deste medicamento ou metformina em monoterapia (uso de apenas um medicamento).

COMO A GLIMEPIRIDA FUNCIONA?

A glimepirida diminui as concentrações sanguíneas da glicose, principalmente pela estimulação da secreção de insulina. Os picos de redução da glicemia em pacientes diabéticos do tipo 2 ocorreram em 2 a 4 horas após a ingestão do medicamento.

APRESENTAÇÃO

- 1 mg comprimido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0297.002-1 - Cód.: 20534
- 2 mg comprimido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0297.015-3 - Cód.: 20535
- 4 mg comprimido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0297.041-2 - Cód.: 20536

Acesse a bula do produto:



Glibenclamida

Comprimido

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIDIABÉTICOS

USO ORAL - USO ADULTO



PARA QUE GLIBENCLAMIDA É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de Diabetes mellitus não insulino-dependente (Tipo 2 ou diabetes do adulto), quando os níveis de glicose no sangue não podem ser controlados apenas por dieta, exercício físico e redução de peso.

COMO GLIBENCLAMIDA FUNCIONA?

Este medicamento é um produto que apresenta como princípio ativo a glibenclamida, antidiabético oral do grupo das sulfonilureias, com potente ação hipoglicemiante (diminuição de açúcar no sangue) e ótima tolerabilidade. Após dose única matinal, o efeito hipoglicemiante permanece detectável por aproximadamente 24 horas. O início da ação ocorre em aproximadamente 1 hora a 90 minutos.

APRESENTAÇÃO

- 5 mg c/ 30 comprimidos (1x30) - Reg. MS 1.2568.0178.001-6 - Cód.: 5514

Acesse a bula do produto:



Hidroclorotiazida

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 5195 / 1x30



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
DAONIL / Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antidiabéticos

Hidroclorotiazida


Comprimido

CLASSE TERAPÊUTICA – DIURÉTICO TIAZÍDICO; ANTIHIPERTENSIVO

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE HIDROCLOROTIAZIDA É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento da pressão alta, quer isoladamente ou em associação com outros fármacos antihipertensivos (medicamentos que tratam a pressão alta). Pode ser ainda utilizado no tratamento dos inchaços associados com insuficiência cardíaca congestiva (condição em que o coração é incapaz de bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades do corpo), cirrose hepática (condição ocasionada por certas doenças crônicas do fígado que destroem suas células) e com a terapia por corticosteroides ou estrógenos (hormônios). Também é eficaz no inchaço relacionado a várias formas de disfunção renal, como síndrome nefrótica (condição caracterizada por presença de proteína na urina), glomerulonefrite aguda (inflamação dos glomérulos dos rins) e insuficiência renal crônica (condição nas quais os rins apresentam atividade abaixo dos níveis normais).



COMO HIDROCLOROTIAZIDA FUNCIONA?

Este medicamento possui em sua fórmula uma substância chamada hidroclorotiazida, que pertence à classe de substâncias tiazidas. Esta substância tem uma ação diurética, isto é, aumenta a eliminação de líquidos do organismo através da urina. O início de ação ocorre 2 horas após sua administração, sendo de 1 a 2 ½ horas, após administração oral, o tempo de atingimento da concentração máxima plasmática. A ação da hidroclorotiazida persiste por aproximadamente 6 a 12 horas.

APRESENTAÇÃO

25 mg c/ 30 comprimidos (1x30)

Reg. MS 1.2568.0178.001-6

Cód.: 5195



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Acesse a bula do produto:



Ibuprofeno

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**



Cód.: 3990 / 2x10

Cód.: 17270 / 3x10

Cód.: 12765 / 28x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

MOTRIN / Laboratórios Pfizer Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Anti-Inflamatórios

FORTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022

Ibuprofeno

Comprimido Revestido



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-INFLAMATÓRIOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE IBUPROFENO 600MG É INDICADO?

Este medicamento tem ação contra a inflamação (reação de defesa do organismo a uma agressão), dor e febre. Ibuprofeno é indicado no alívio dos sinais e sintomas de osteoartrite (lesão crônica das articulações ou “juntas”) e artrite reumatoide (inflamação crônica das “juntas” causada por reações autoimunes, quando o sistema de defesa do corpo ataca por engano ele próprio), reumatismo articular (inflamação das “juntas”), nos traumas relacionados ao sistema musculoesquelético (como entorse do tornozelo e dor nas costas) e alívio da dor após procedimentos cirúrgicos em odontologia, ginecologia, ortopedia, traumatologia e otorrinolaringologia.



COMO IBUPROFENO 600MG FUNCIONA?

O ibuprofeno é um agente anti-inflamatório não esteroide (não derivado de hormônios) que inibe a produção de prostaglandinas (substâncias que estimulam a inflamação) o que gera atividade anti-inflamatória (reduz a inflamação), analgésica (redução, até supressão, da dor) e antipirética (redução, até supressão, da febre).

APRESENTAÇÕES

- 600 mg c/ 20 comprimidos revestidos (2x10) - Reg. MS 1.2568.0161.001-3 - Cód.: 3990
- 600 mg c/ 30 comprimidos revestidos (3x10) - Reg. MS 1.2568.0161.008-0 - Cód.: 17270
- 600 mg c/ 280 comprimidos revestidos (28x10) - Reg. MS 1.2568.0161.005-6 - Cód.: 12765 - Embalagem Fracionável

**Acesse a bula
do produto:**



Indapamida

Comprimido Revestido
de Liberação Prolongada

G Medicamento
Genérico

**LIBERAÇÃO
PROLONGADA**



Cód.: 18562/ 3x10

Cód.: 18563 / 6x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

NATRILIX SR - Laboratórios Servier do Brasil Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA

Diuréticos Simples

Indapamida

Comprimido Revestido de Liberação Prolongada

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – DIURÉTICOS SIMPLES

USO ORAL - USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS

PARA QUE A INDAPAMIDA É INDICADA?

Este medicamento é indicado no tratamento da hipertensão arterial essencial.



COMO A INDAPAMIDA FUNCIONA?

É um comprimido de liberação prolongada que contém indapamida como seu princípio ativo. Indapamida é um diurético. A maioria dos diuréticos aumenta a quantidade de urina produzida pelos rins. Entretanto, indapamida é diferente dos outros diuréticos, de maneira que ela causa apenas um sutil aumento na quantidade de urina produzida. Indapamida age no controle da pressão arterial, através de um mecanismo vascular, com sua manutenção dentro dos limites fisiológicos. A atividade anti-hipertensiva de Indapamida é máxima na primeira hora após a administração de uma dose única e é mantida por no mínimo 24 horas.

APRESENTAÇÕES

1,5 mg comprimido revestido de liberação prolongada (3x10)

Reg. MS 1.2568.0267.003-6

Cód.: 18562

1,5 mg comprimido revestido de liberação prolongada (6x10)

Reg. MS 1.2568.0267.004-4

Cód.: 18563

Acesse a bula do produto:



Ivermectina

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 23273 / 1x2

Cód.: 23274 / 1x4



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

REVECTINA – ABBOTT LABORATÓRIOS BRASIL LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIPARASITÁRIOS

Ivermectina

Comprimido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIPARASITÁRIOS

**USO ORAL – USO ADULTO ACIMA DE 5 ANOS
OU COM MAIS DE 15 KG**

PARA QUE A IVERMECTINA É INDICADA?

Este medicamento é indicado para o tratamento de várias condições causadas por vermes ou parasitas. Estudos demonstram que a ivermectina funciona no tratamento das seguintes infecções:

Estrongiloidíase intestinal: causada por um parasita denominado *Strongyloides stercoralis*.


Oncocercose: causada por um parasita denominado *Onchocerca volvulus*.

Filariose (elefantíase): causada pelo parasita *Wuchereria bancrofti*.

Ascariíase (lombriga): causada pelo parasita *Ascaris lumbricoides*.

Escabiose (sarna): causada pelo parasita *Sarcoptes scabiei*.

Pediculose (piolho): causada pelo parasita *Pediculus humanus capitis*.



COMO A IVERMECTINA FUNCIONA?

Este medicamento atua contra várias espécies de parasitas e vermes. Sua ação se dá por meio da paralisação da musculatura de vermes e parasitas, ocasionando a morte e eliminação desses do seu corpo. Este medicamento é rapidamente absorvido por via oral, atingindo uma concentração máxima no sangue em 4 horas, sendo eliminado em até 18 horas.

APRESENTAÇÕES

- 6 mg comprimido (1x2) • Reg. MS 1.2568.0331.001-7 • Cód.: 23273

- 6 mg comprimido (1x4) • Reg. MS 1.2568.0331.002-5 • Cód.: 23274

**Acesse a bula
do produto:**



Lamotrigina

Comprimido

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 19559/3x10

Cód.: 19560/3x10

Cód.: 19561/3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
LAMICTAL/GlaxoSmithKline Brasil Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Anticonvulsivantes

Lamotrigina

Comprimido



CLASSE TERAPÊUTICA - ANTICONVULSIVANTES

**USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 12 ANOS**

PARA QUE A LAMOTRIGINA É INDICADA?

A lamotrigina é uma droga antiepilética (DAE), usada no tratamento de crises convulsivas parciais e crises generalizadas. Pode ser instituído como monoterapia (única droga do tratamento) ou em terapia combinada (associado a outras drogas antiepiléticas).



COMO A LAMOTRIGINA FUNCIONA?

Os resultados de estudos farmacológicos sugerem que a lamotrigina age nas células nervosas inibindo a liberação de substâncias capazes de provocar crises epiléticas (convulsivas). A dose a ser utilizada de lamotrigina é aumentada gradualmente até atingir uma resposta adequada. Esse processo pode levar até cinco semanas. A partir daí, é iniciada a utilização da dose de manutenção. Sendo assim, este medicamento leva cerca de 33 dias para que a dose de manutenção atinja níveis ótimos no organismo. Porém, isto pode variar dependendo da idade ou no caso de utilização de alguns medicamentos que possam interferir na ação de lamotrigina.

APRESENTAÇÕES

- 25 mg comprimido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0275.001-3 - Cód.: 19559
- 50 mg comprimido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0275.007-2 - Cód.: 19560
- 100 mg comprimido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0275.013-7 - Cód.: 19561

**Acesse a bula
do produto:**



Lansoprazol

G Medicamento
Genérico

Cápsula de Liberação Retardada



Cód.: 8713 / 2x7

Cód.: 16141 / 4x7



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

LANSOPRAZOL/Legrand

CLASSE TERAPÊUTICA

Antiulcerosos

FONTE:

IQVIA MAT MARÇO/2022

Lansoprazol



Cápsula de Liberação Retardada

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIULCEROSOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE LANSOPRAZOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para cicatrização e alívio da esofagite e do refluxo gastroesofágico (retorno do conteúdo ácido do estômago para o esôfago), de úlcera do duodeno e estômago, em tratamento de curto prazo. Para tratamento em longo prazo de pacientes portadores ou não de Síndrome de Zollinger-Ellison (hiperacidez do estômago causado pela presença do gastrinoma, que é um tumor produtor de gastrina) e úlcera de Barrett (troca da camada interna que recobre o esôfago por outro tipo podendo aparecer úlceras).



COMO LANSOPRAZOL FUNCIONA?

Este medicamento diminui a acidez do estômago. É utilizado no tratamento de doença péptica ulcerosa (úlcera no estômago e/ou duodeno), e em outras condições onde a diminuição da secreção gástrica é benéfica. O tempo médio de ação deste medicamento está entre 1,5 e 2,2 horas, em jejum, mas a ação pode durar ainda mais. O tempo de eliminação é de menos que 2 horas, enquanto que o efeito inibidor ácido, dura mais que 24 horas. A eliminação ocorre principalmente pela excreção biliar (no fígado); a eliminação urinária é de somente 15% da dose administrada.

APRESENTAÇÕES

30 mg c/ 14 cápsulas (2x7)
Reg. MS 1.2568.0211.002-2
Cód.: 8713

30 mg c/ 28 cápsulas (4x7)
Reg. MS 1.2568.0211.003-0
Cód.: 16141

**Acesse a bula
do produto:**



Levofloxacin

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

ATENÇÃO
Antibiótico
Medicamento



Cód.: 18250 / 1x7

Cód.: 18252 / 1x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
LEVAQUIN / Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antibióticos sistêmicos simples

Levofloxacino

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS SIMPLES


USO ORAL - USO ADULTO

ATENÇÃO! ANTIBIÓTICO!

PARA QUE LEVOFLOXACINO É INDICADO?

Este medicamento é indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas por agentes sensíveis ao levofloxacino, tais como:

- Infecções do trato respiratório superior e inferior, incluindo sinusite, exacerbações agudas de bronquite crônica e pneumonia;
- Infecções da pele e tecido subcutâneo, complicadas e não-complicadas, tais como impetigo, abscessos, furunculose, celulite e erisipela;
- Infecções do trato urinário, incluindo pielonefrite aguda;
- Osteomielite.



COMO LEVOFLOXACINO FUNCIONA?

Este é um medicamento pertencente ao grupo dos fármacos conhecidos como antibióticos, utilizado para o tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis ao levofloxacino. A ação do levofloxacino inicia-se logo após a sua administração, continuando progressivamente com o decorrer do tratamento, até a eliminação da infecção.

APRESENTAÇÕES

500 mg c/ 7 comprimidos revestidos (1x7)

Reg. MS 1.2568.0260.003-8

Cód.: 18250

500 mg c/ 10 comprimidos revestidos (1x10)

Reg. MS 1.2568.0260.004-6

Cód.: 18252

Acesse a bula do produto:



Losartana Potássica

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico



REFERÊNCIA: COZAAR / Merck Sharp Dohme Farmacêutica Ltda.
CLASSE TERAPÊUTICA: Anti-hipertensivos simples



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Losartana Potássica


Comprimido Revestido

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HIPERTENSIVOS SIMPLES

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE LOSARTANA POTÁSSICA É INDICADO?

O seu médico receitou este medicamento para tratar sua hipertensão (pressão alta) ou por você ter uma doença conhecida como insuficiência cardíaca (enfraquecimento do coração). Em pacientes com pressão alta e hipertrofia ventricular esquerda, este medicamento reduziu o risco de derrame (acidente vascular cerebral) e de ataque cardíaco (infarto do miocárdio) e ajudou esses pacientes a viverem mais. Uso em pacientes de raça negra com pressão alta e hipertrofia do ventrículo esquerdo). O seu médico também pode ter receitado este medicamento por você ter diabetes tipo 2 e proteinúria; nesse caso, este medicamento pode retardar a piora da doença renal.



COMO LOSARTANA POTÁSSICA FUNCIONA?

Este medicamento age dilatando os vasos sanguíneos para ajudar o coração a bombear o sangue para todo

o corpo com mais facilidade. Essa ação ajuda a reduzir a pressão alta. Em muitos pacientes com insuficiência cardíaca, este medicamento irá auxiliar no melhor funcionamento do coração. Este medicamento também diminui o risco de doenças do coração e dos vasos sanguíneos, como derrame em pacientes com pressão alta e espessamento das paredes do ventrículo esquerdo do coração (hipertrofia ventricular esquerda). Além desses efeitos sobre a pressão arterial, este medicamento também ajuda a proteger seus rins se você tiver diabetes tipo 2 e proteinúria (perda de proteína na urina por comprometimento dos rins).

**Acesse a bula
do produto:**



APRESENTAÇÕES

- 50 mg c/ 30 comprimidos revestidos (2x15) - Reg. MS 1.2568.0202.002-3 - Cód.: 7528
- 50 mg c/ 60 comprimidos revestidos (4x15) - Reg. MS 1.2568.0202.017-1 - Cód.: 17515
- 100 mg c/ 30 comprimidos revestidos (2x15) - Reg. MS 1.2568.0202.006-6 - Cód.: 7532



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Losartana Potássica + Hidroclorotiazida

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 19922/ 3x10

Cód.: 19923 / 6x10

REFERÊNCIA: Hyzaar - Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.
CLASSE TERAPÊUTICA: Anti-hipertensivos



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.


Losartana Potássica + Hidroclorotiazida

Comprimido Revestido

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HIPERTENSIVOS
USO ORAL – USO ADULTO

PARA QUE LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA É INDICADA?

Seu médico receitou este medicamento para tratamento da hipertensão (pressão alta). Em pacientes com pressão alta e espessamento das paredes do ventrículo esquerdo (hipertrofia do ventrículo esquerdo), a losartana, frequentemente em combinação com a hidroclorotiazida, reduz o risco de derrame (acidente vascular cerebral) e de ataque cardíaco (infarto do miocárdio) e ajuda os pacientes a viverem mais (vide QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? e O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Uso em pacientes de raça negra com pressão alta e aumento do ventrículo esquerdo).



COMO A LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA FUNCIONA?

Este medicamento é uma combinação de um antagonista dos receptores de angiotensina II (losartana) e um diurético (hidroclorotiazida). A losartana e a hidroclorotiazida agem em conjunto para diminuir a pressão alta. Se você tem pressão alta e apresenta espessamento das paredes do ventrículo esquerdo, a principal câmara de bombeamento do coração, seu médico prescreveu este medicamento para ajudar a diminuir o risco de eventos cardiovasculares, como derrame (acidente vascular cerebral).

APRESENTAÇÕES

- 100 mg + 25 mg c/30 comprimidos revestidos (3x10) - Reg. MS 1.2568.0306.008-8 - Cód.: 19922
- 100 mg + 25 mg c/60 comprimidos revestidos (6x10) - Reg. MS 1.2568.0306.010-1 - Cód.: 19923

**Acesse a bula
do produto:**



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Maleato de Dexclorfeniramina+ Betametasona

Xarope

G Medicamento
Genérico

 Acompanha
Copo Medida



Cód.: 15542 / 120ml



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
CELESTAMINE/Hypermarcas

CLASSE TERAPÊUTICA
Anti-histamínicos sistêmicos


Maleato de Dexclorfeniramina+ Betametasona Xarope

**ATENÇÃO**Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.**CLASSE TERAPÊUTICA – ANTI-HISTAMÍNICOS SISTÊMICOS****USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS****PARA QUE MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA +
BETAMETASONA É INDICADO?**

Este medicamento é indicado no tratamento adjuvante de doenças alérgicas do aparelho respiratório, como: asma brônquica grave e rinite alérgica; nas doenças alérgicas da pele, como: dermatite atópica (eczema), dermatite de contato, reações medicamentosas e doença do soro, e nas doenças alérgicas inflamatórias oculares, como: ceratites (inflamações da córnea), conjuntiva (conjuntivite) e das porções internas do olho (irite não granulomatosa, coriorretinite, iridociclite, coroidite e uveíte). Nestas doenças oculares, este medicamento inibe a fase aguda da inflamação, com produção de secreções, contribuindo para preservar a integridade funcional do globo ocular, enquanto se realiza o tratamento da infecção ou de distúrbio por outra causa com terapia específica.

**COMO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA +
BETAMETASONA FUNCIONA?**

Este medicamento reúne o efeito anti-inflamatório e antialérgico da betametasona e a ação anti-histamínica do maleato de dexclorfeniramina. O uso combinado da betametasona e do maleato de dexclorfeniramina permite a utilização de doses menores de corticosteroides com resultados semelhantes aos obtidos com doses mais altas de corticoide isoladamente.

**APRESENTAÇÃO**

0,4 mg/ml + 0,05 mg/ml xarope

120ml + copo medida

Reg. MS 1.2568.0085.010-1

Cód.: 15542

**Acesse a bula
do produto:**

Meloxicam

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 18667/ 1x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Bioflac / Cristália - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Anti-inflamatórios.

Meloxicam

Comprimido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTI-INFLAMATÓRIOS


Uso ORAL
Uso ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

PARA QUE O MELOXICAM É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento dos sintomas da artrite reumatoide e osteoartrite (doenças das articulações), aliviando a dor e a inflamação.

COMO O MELOXICAM FUNCIONA?

Este medicamento apresenta propriedades anti-inflamatórias contra dor e febre. Ele age inibindo preferencialmente o funcionamento da enzima responsável pela inflamação, COX-2, e da COX-1 em menor extensão. O tempo médio para o início da ação é de 80 a 90 minutos após a ingestão.



APRESENTAÇÃO

15 mg comprimido
Reg. MS
1.2568.0305.001-5
Cód.: 18667

**Acesse a bula
do produto:**



Mesalazina

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 19568/3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

MESALAZINA/Brainfarma
Indústria Química e Farmacêutica S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos para o aparelho digestivo e metabolismo

Mesalazina

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA

OUTROS PRODUTOS PARA O APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO

USO ORAL

USO ADULTO

PARA QUE A MESALAZINA É INDICADA?

Este medicamento é utilizado no tratamento das doenças inflamatórias intestinais.



COMO A MESALAZINA FUNCIONA?

Este medicamento contém como princípio ativo a mesalazina, que atua nas doenças inflamatórias do intestino, acelerando a cicatrização dos processos inflamatórios e reduzindo o número de recidivas.

APRESENTAÇÃO

400 mg comprimido revestido (3x10)

Reg. MS 1.2568.0276.002-7

Cód.: 19568

**Acesse a bula
do produto:**



Mesilato de Doxazosina

Comprimido

G Medicamento Genérico



Cód.: 18978/3x10

Cód.: 18979/3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Mesilato de Doxazosina - Merck/S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos com ação no trato urinário.

Mesilato de Doxazosina

Comprimido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA

OUTROS PRODUTOS COM AÇÃO NO TRATO URINÁRIO

USO ORAL

USO ADULTO

PARA QUE O MESILATO DE DOXAZOSINA É INDICADA?

Este medicamento é indicado para o tratamento dos sintomas da hiperplasia prostática benigna – HPB, assim como para o tratamento da redução do fluxo urinário associada à HPB. É indicado para o tratamento da hipertensão e pode ser utilizado como agente inicial para o controle da pressão sanguínea na maioria dos pacientes.



COMO O MESILATO DE DOXAZOSINA FUNCIONA?

A doxazosina, princípio ativo deste produto, pertence à classe dos medicamentos chamados anti-hipertensivos (que diminuem a pressão sanguínea). Age relaxando os vasos sanguíneos permitindo que o sangue passe mais facilmente. A doxazosina também relaxa os músculos da próstata e do colo (parte mais inferior) da bexiga.

APRESENTAÇÕES

2 mg comprimido (3x10)

Reg. MS 1.2568.0299.001-4

Cód.: 18978

4 mg comprimido (3x10)

Reg. MS 1.2568.0299.018-9

Cód.: 18979

Acesse a bula do produto:



Metildopa

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 20755/ 3x10

Cód.: 20752/ 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Aldomet / Aspen Pharma Indústria Farmacêutica LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA

Anti-hipertensivos.

Metildopa

Comprimido Revestido




CLASSE TERAPÊUTICA
ANTI-HIPERTENSIVOS

USO ORAL
Uso ADULTO

PARA QUE A METILDOPA É INDICADA?

Este medicamento é destinado para o tratamento da hipertensão (pressão alta).



COMO A METILDOPA FUNCIONA?

Este é um medicamento que pertence a um grupo de fármacos chamado agentes simpatolíticos de ação central. Metildopa age diminuindo os impulsos do sistema nervoso central que aumentam a pressão arterial. A redução máxima da pressão arterial ocorre de quatro a seis horas após tomar o medicamento.

APRESENTAÇÕES

250 mg comprimido revestido
Reg. MS 1.2568.0304.001-1
Cód.: 20752

500 mg comprimido revestido
Reg. MS 1.2568.0304.015-1
Cód.: 20755

***Acesse a bula
do produto:***



Metronidazol + Nistatina

Creme

Metronidazol

Gel e Comprimido
Revestido

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

 **ATENÇÃO**
Antibiótico
Medicamento

Acompanha ***1 e *2**
10 Aplicadores
Ginecológicos

Cód.: 190 / 50g



Cód.: 5577 / 2x10

Cód.: 12457 / 50g

*1 - METRONIDAZOL + NISTATINA - CREME

REFERÊNCIA: FLAGYL NISTATINA / Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA: Antifúngicos tópicos - Associações Medicamentosas

*2 - METRONIDAZOL - GEL

REFERÊNCIA: OZEX/ Galderma

CLASSE TERAPÊUTICA: ROZEX/ Galderma

3 - METRONIDAZOL - COMPRIMIDO REVESTIDO

REFERÊNCIA: FLAGYL / Sanofi - Aventis Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA: Amebicidas, giardídeos e tricomonídeos



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Metronidazol + Nistatina

Creme



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS – ASSOCIAÇÕES MEDICAMENTOSAS
USO TÓPICO INTRAVAGINAL – USO ADULTO
ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

PARA QUE METRONIDAZOL + NISTATINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de vaginites (inflamação na vagina) específicas por *Trichomonas vaginalis*, *Candida albicans* ou por associação de ambos.

COMO METRONIDAZOL + NISTATINA FUNCIONA?

Este medicamento é um anti-infeccioso de uso local que apresenta atividade antiparasitária e antimicrobiana. A absorção máxima ocorre entre 8 e 12 horas.

APRESENTAÇÃO

• 100 mg/g + 20.000 UI/g creme 50 g + 10 aplicadores ginecológicos
Reg. MS 1.2568.0044.003-3 - Cód.: 190

**Acesse a bula
do produto:**



Metronidazol

Gel

CLASSE TERAPÊUTICA – AMEBICIDAS, GIARDICIDAS E TRICOMONICIDAS
USO VAGINAL – USO ADULTO
ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

PARA QUE METRONIDAZOL GEL É INDICADO?

Este medicamento é indicado no tratamento de tricomoníase (infecções produzidas por várias espécies de *Trichomonas*).

COMO METRONIDAZOL GEL FUNCIONA?

Este medicamento é um anti-infeccioso de uso local indicado no tratamento de tricomoníase. A absorção máxima ocorre entre 8 à 12 horas.

APRESENTAÇÃO

• 100 mg/g gel 50 g + 10 aplicadores ginecológicos
Reg. MS 1.2568.0043.004-6 - Cód.: 12457

**Acesse a bula
do produto:**



Metronidazol

Comprimido Revestido

CLASSE TERAPÊUTICA – AMEBICIDAS, GIARDICIDAS E TRICOMONICIDAS
USO ORAL – USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS
ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

PARA QUE METRONIDAZOL É INDICADO?

Este medicamento está indicado no tratamento de giardíase (infecção do intestino delgado causada pelo protozoário flagelado, *Giardia lamblia*), amebíase (infecção causada por qualquer uma de várias amebas), tricomoníase (infecções produzidas por várias espécies de *Trichomonas*), vaginites (inflamação na vagina) por *Gardnerella vaginalis* e infecções causadas por bactérias anaeróbias (que crescem na presença de baixas concentrações de oxigênio ou até mesmo na sua ausência) como *Bacteroides fragilis* e outros bacteroides, *Fusobacterium* sp, *Clostridium* sp, *Eubacterium* sp e cocos anaeróbios.

COMO METRONIDAZOL FUNCIONA?

Este medicamento é um anti-infeccioso que apresenta atividade antimicrobiana, que abrange exclusivamente micro-organismos anaeróbios, e atividade antiparasitária. A absorção máxima ocorre entre 1 a 2 horas.

APRESENTAÇÃO

• 250 mg c/20 comprimidos revestidos (2x10) - Reg. MS 1.2568.0182.001-8 - Cód.: 5577

**Acesse a bula
do produto:**



Mirtazapina

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 19064/3x10

Cód.: 19066/3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
MIRTAZAPINA/Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antidepressivos

Mirtazapina

Comprimido Revestido



CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIDEPRESSIVOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE A MIRTAZAPINA É INDICADA?

Este medicamento é destinado ao tratamento de estados depressivos.



COMO A MIRTAZAPINA FUNCIONA?

A mirtazapina é um medicamento pertencente à classe dos antidepressivos. Estes medicamentos atuam sobre as funções químicas desbalanceadas em seu cérebro responsáveis pela depressão.

APRESENTAÇÕES

30 mg comprimido revestido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0277.003-0
Cód.: 19064

45 mg comprimido revestido (3x10)
Reg. MS 1.2568.0277.012-1
Cód.: 19066

**Acesse a bula
do produto:**



Mupirocina

Pomada

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita

 **ATENÇÃO**
Antibiótico
Medicamento



Cód.: 3467 / 15g



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
BACTROBAN / GSK Brasil Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA
Antinfeciosos tópicos

Mupirocina

Pomada



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTINFECIOSOS TÓPICOS

USO DERMATOLÓGICO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO


ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!

PARA QUE MUPIROCINA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento tópico de infecções de pele (como impetigo, foliculite e furunculose) causadas por micro-organismos sensíveis à mupirocina.

COMO MUPIROCINA FUNCIONA?

Este medicamento é uma pomada que contém o antibiótico mupirocina. Como antibiótico tópico (ou seja, para ser aplicado diretamente na pele), elimina germes contaminantes, agindo contra os micro-organismos responsáveis pela MARÇOr parte das infecções de pele. Este medicamento começa a fazer efeito assim que você passa a pomada na pele. Consulte seu médico caso não observe melhora dentro de 3 a 5 dias após o início do tratamento.



APRESENTAÇÃO

20 mg/g pomada dermatológica 15g
Reg. MS 1.2568.0157.001-1
Cód.: 3467

**Acesse a bula
do produto:**



Nervamin

Cloridrato de Tiamina
Comprimido revestido

E Medicamento
Específico



Cód.: 12174 / 2x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA

Vitaminas

Nervamin

Cloridrato de Tiamina Comprimido revestido

CLASSE TERAPÊUTICA
VITAMINAS

USO ORAL
USO ADULTO

PARA QUE NERVAMIN É INDICADO?

Nervamin é recomendado para grupos de pessoas mais sensíveis a deficiência de vitamina B1 como pessoas idosas e indivíduos com problemas crônicos de absorção intestinal.



COMO NERVAMIN FUNCIONA?

Nervamin é recomendado para prevenir e tratar a deficiência de vitamina B1, a qual é essencial para o crescimento e desenvolvimento normal do organismo, reprodução e também para atividade física. A vitamina B1 participa de processos metabólicos importantes do sistema nervoso, coração, células do sangue e músculos e também do metabolismo dos carboidratos. A sua deficiência é associada a falta de apetite, fraqueza e irritabilidade, alterações na função cardíaca e anormalidades neurológicas.

APRESENTAÇÃO

300 mg c/ 30 comprimidos
revestidos (2x15)
Reg. MS 1.2568.0223.001-1
Cód.: 12174



**Acesse a bula
do produto:**



Nimesulida

Comprimido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 19304/1x12



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
NISULID/ Aché

CLASSE TERAPÊUTICA
Anti-inflamatório

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022

Nimesulida

Comprimido



CLASSE TERAPÊUTICA
ANTI-INFLAMATÓRIO


USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

PARA QUE A NIMESULIDA É INDICADA?

Este medicamento é destinado ao tratamento de uma variedade de condições que requeiram atividade anti-inflamatória (contra a inflamação), analgésica (contra a dor) e antipirética (contra a febre).

COMO A NIMESULIDA FUNCIONA?

Este medicamento apresenta propriedades que combatem a inflamação, a dor e a febre, e sua atividade anti-inflamatória envolve vários mecanismos. A nimesulida inibe uma enzima chamada cicloxigenase, a qual esta relacionada a produção de uma substância chamada prostaglandina, tal inibição faz com que a dor e a inflamação diminuam. O tempo médio estimado para início da ação depois que você tomar este medicamento é de 15 minutos para alívio da dor. A resposta inicial para a febre acontece cerca de 1 a 2 horas após o uso do medicamento e dura aproximadamente 6 horas.



APRESENTAÇÕES

100 mg comprimido (1x12)
Reg. MS 1.2568.0265.002-7
Cód.: 19304

**Acesse a bula
do produto:**



Nistatina

Creme Vaginal e Suspensão

G Medicamento
Genérico

Acompanha
X14 Aplicadores
Ginecológicos

 Sabor
Canela



Cód.: 116 / 50ml

Cód.: 12438 / 60g



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

Suspensão Oral o referência é o CANDITRAT/ Teuto
Creme Vaginal o referência é o MICOSTATIN / Takeda

CLASSE TERAPÊUTICA
Antimicótico

Nistatina

Creme Vaginal

Suspensão

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIMICÓTICO

USO GINECOLÓGICO - USO ORAL (SUSPENSÃO ORAL)

USO ADULTO (CREME VAGINAL) - USO ADULTO E PEDIÁTRICO (SUSPENSÃO ORAL)

PARA QUE NISTATINA É INDICADO?

Creme Vaginal - Este medicamento é indicado para o tratamento de candidíase vaginal (monilíase - infecção na mucosa da vagina com lesões esbranquiçadas).

Suspensão Oral - Este medicamento é um antifúngico, um produto destinado a combater os fungos, entre eles um muito comum em recém-nascidos e lactentes - “o sapinho” (*Candida albicans*). Este fungo pode também aparecer na boca de indivíduos adultos, principalmente em casos de uso de próteses dentárias ou quando o organismo está enfraquecido por falta de nutrientes, vitaminas e problemas imunológicos. Mais recentemente a ocorrência do “sapinho” em adultos, atingindo tanto a região da boca, como outras porções do trato digestivo (esôfago e intestinos), tem sido observado em pacientes portadores de moléstias graves ou tratamentos com imunodepressores e nos casos de queda da imunidade como ocorre na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).



COMO NISTATINA FUNCIONA?

A nistatina age no combate a fungos sensíveis a este medicamento, como *Candida albicans* (monília ou sapinho) e outros. A nistatina liga-se à parede das células dos fungos sensíveis e a altera, causando a sua destruição. A nistatina não apresenta atividade contra bactérias, protozoários ou vírus. Como a nistatina tem absorção insignificante no trato gastrointestinal (estômago e intestinos) a ação do produto tem início tão logo o mesmo entra em contato com o organismo na boca ou intestino.

APRESENTAÇÕES

25.000 UI/g creme vaginal 60 g + 14
aplicadores ginecológicos
Reg. MS 1.2568.0045.009-8
Cód.: 12438

100.00 UI/ml suspensão oral 50 ml
gotas
Reg. MS 1.2568.0026.004-3
Cód.: 116

**Acesse a bula
do produto:**



Nitrato de Miconazol

Creme

G Medicamento Genérico

Acompanha
14 Aplicadores Ginecológicos



Cód.: 12455 / 80g



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

NITRATO DE MICONAZOL/Teuto.

CLASSE TERAPÊUTICA

Antimicótico

Nitrato de Miconazol

Creme

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIMICÓTICO

USO TÓPICO (INTRAVAGINAL)
USO ADULTO

PARA QUE NITRATO DE MICONAZOL É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de infecções na região vaginal produzidas por fungos.



COMO NITRATO DE MICONAZOL FUNCIONA?

O nitrato de miconazol, substância ativa deste medicamento é um agente antifúngico com amplo espectro de ação. A ação do medicamento e o alívio dos sintomas são observados logo após as primeiras aplicações.

APRESENTAÇÃO

20 mg/g creme 80 g + 14 aplicadores ginecológicos
Reg. Ms 1.2568.0053.004-0
Cód.: 12455

**Acesse a bula
do produto:**



Olanzapina

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico

 Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 19497/3x10

Cód.: 19498/3x10

Cód.: 19499/3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
ZYPREXA/Eli Lilly do Brasil Ltda

CLASSE TERAPÊUTICA
Antipsicóticos

Olanzapina

Comprimido Revestido



CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIPSICÓTICOS

USO ORAL - USO ADULTO

PARA QUE A OLANZAPINA É INDICADA?

Este medicamento é indicado para o tratamento agudo e de manutenção da esquizofrenia e outros transtornos mentais (psicoses) em adultos, nos quais sintomas positivos (exemplo: delírios, alucinações, alterações de pensamento, hostilidade e desconfiança) e/ou sintomas negativos (exemplo: afeto diminuído, isolamento emocional/social e pobreza de linguagem) são proeminentes. Este medicamento alivia também os sintomas afetivos secundários na esquizofrenia e os transtornos relacionados. Este medicamento é eficaz na manutenção da melhora clínica durante o tratamento contínuo nos pacientes adultos que responderam ao tratamento inicial. Este medicamento, em monoterapia ou em combinação com lítio ou valproato, é indicado para o tratamento de episódios de mania aguda ou mistos de transtorno bipolar em pacientes adultos, com ou sem sintomas psicóticos e, com ou sem ciclagem rápida. Este medicamento é indicado para prolongar o tempo entre os episódios e reduzir as taxas de recorrência dos episódios de mania, mistos ou depressivos, no transtorno bipolar.



COMO A OLANZAPINA FUNCIONA?

Este medicamento é classificado como antipsicótico e que age no Sistema Nervoso Central, ocasionando a melhora dos sintomas em pacientes com esquizofrenia e outros transtornos mentais (psicoses), e dos episódios maníacos (euforia) e mistos do transtorno afetivo bipolar. Além disso, nos pacientes com transtorno afetivo bipolar, previne novas fases de mania e depressão. O mecanismo de ação deste medicamento no tratamento da esquizofrenia e no tratamento de episódios de mania aguda ou mistos, do transtorno bipolar é desconhecido. Quando este medicamento é utilizado por via oral (pela boca), em doses diárias entre 5 e 20 mg, para o tratamento da esquizofrenia e outras condições relacionadas, ou em doses diárias de pelo menos 15 mg para o tratamento de mania (ou episódios mistos) associada a transtorno bipolar, você e/ou o seu médico podem verificar uma melhora inicial nos sintomas gerais destas condições na primeira semana de tratamento.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÕES

- 2,5 mg comprimido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0273.007-1 - Cód.: 19497
- 5 mg comprimido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0273.019-5 - Cód.: 19498
- 5 mg comprimido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0273.019-5 - Cód.: 19498

Orlistate

Cápsula dura

G Medicamento
Genérico

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**



REFERÊNCIA

XENICAL / Produtos Roche Químicos e
Farmacêuticos S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Moduladores do metabolismo e da digestão

FONTE:

IQVIA MAT MARÇO/2022



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Orlistate

Cápsula dura



CLASSE TERAPÊUTICA
MODULADORES DO METABOLISMO E DA DIGESTÃO

USO ORAL
USO ADULTO

PARA QUE ORLISTATE É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de pacientes com sobrepeso ou obesidade. É eficaz no controle de peso em longo prazo. Este medicamento melhora os fatores de risco associados ao excesso de peso, como hipercolesterolemia, intolerância à glicose, diabetes do tipo 2, hiperinsulinemia, hipertensão arterial e promove também a redução da gordura visceral. Este medicamento em um terapia combinada auxilia no controle adicional do açúcar no sangue.



COMO ORLISTATE FUNCIONA?

Orlistate age diretamente no sistema digestivo, impedindo que cerca de 30% da gordura que você ingeriu com a alimentação seja absorvida em cada refeição, e esse excesso é eliminado com as fezes. Portanto, seu organismo deixará de armazenar uma boa quantidade de gorduras por refeição, ajudando-o a reduzir o seu peso. Além disso, contribuirá para prevenir um novo ganho de peso, diminuindo os riscos do diabetes, da hipertensão e do colesterol aumentado. O efeito deste medicamento pode ser verificado em 24 a 48 horas após sua administração. A perda de peso e os benefícios decorrentes do uso deste medicamento começam, geralmente, dentro das primeiras duas semanas de tratamento.

APRESENTAÇÕES

120 mg c/ 21 cápsulas (3x7)
Reg. MS 1.2568.0258.001-0
Cód.: 19887

120 mg c/ 42 cápsulas (3x14)
Reg. MS 1.2568.0258.002-9
Cód.: 17861

120 mg c/ 84 cápsulas (6x14)
Reg. MS 1.2568.0258.004-5
Cód.: 17862

**Acesse a bula
do produto:**



Oxalato de Escitalopram

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita



Cód.: 18803 / 2x15

Cód.: 18804 / 4x15



Cód.: 18806 / 2x15

Cód.: 18808 / 4x15

REFERÊNCIA
LEXAPRO® – LUNDBECK BRASIL LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antidepressivos

FONTE:
IQVIA MAT MARÇO/2022



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Oxalato de Escitalopram

Comprimido Revestido



CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIDEPRESSIVOS

USO ORAL
USO ADULTO

PARA QUE OXALATO DE ESCITALOPRAM É INDICADO?

Este medicamento é indicado para tratamento e prevenção da recaída ou recorrência da depressão, tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia, tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG), tratamento do transtorno de ansiedade social (fobia social) e tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC).



COMO OXALATO DE ESCITALOPRAM FUNCIONA?

Este é um medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), que é uma classe do grupo dos antidepressivos. O oxalato de escitalopram age no cérebro, onde corrige as concentrações inadequadas de determinadas substâncias denominadas neurotransmissores, em especial a serotonina, que causam os sintomas na situação de doença.

Pode demorar cerca de duas semanas até você começar a se sentir melhor. Continue a tomar este medicamento mesmo que leve algum tempo até você se sentir melhor.

Você deve procurar seu médico se você não se sentir melhor ou se sentir pior.

APRESENTAÇÕES

10 mg c/ 30 comprimidos revestidos (2x15) - Reg. MS 1.2568.0335.006-1 - Cód.: 18803

10 mg c/ 60 comprimidos revestidos (4x15) - Reg. MS 1.2568.0335.007-8 - Cód.: 18804

20 mg c/ 30 comprimidos revestidos (2x15) - Reg. MS 1.2568.0335.015-9 - Cód.: 18806

20 mg c/ 60 comprimidos revestidos (4x15) - Reg. MS 1.2568.0335.016-7 - Cód.: 18808

**Acesse a bula
do produto:**



Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado

Comprimido Revestido de Liberação Retardada

G Medicamento
Genérico



Cód.: 18146 / 2x14

Cód.: 18148 / 2x14

Cód.: 18149 / 4x14



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
PANTOZOL – NYCOMED PHARMA LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA
Antiácidos e Antiulcerosos Simples

Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado

Comprimido Revestido de Liberação Retardada

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIÁCIDOS E ANTIULCEROSOS SIMPLES

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 5 ANOS

PARA QUE PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO É INDICADO?

Indicado para tratamento de úlcera péptica duodenal, úlcera péptica gástrica e das esofagites de refluxo moderadas ou graves, tratamento da Síndrome de Zollinger-Ellison e de outras doenças causadoras de produção exagerada de ácido pelo estômago, para erradicação do *Helicobacter pylori*, gástrica ou duodenal causadas por este micro-organismo. Neste caso, deve ser associado a dois antibióticos adequados.



COMO PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO FUNCIONA?

Este medicamento reduz a acidez estomacal; previne as lesões gastroduodenais induzidas por medicamentos; este medicamento é classificado como "inibidor de bomba de prótons"(IBO), isto é, inibe uma estrutura localizada dentro de células específicas do estômago responsáveis pela produção de ácido clorídrico. O pantoprazol atua na etapa final da secreção ácida, independente do estímulo desta. Por meio de um mecanismo de autoinibição, o seu efeito diminui à medida que a secreção é inibida.

APRESENTAÇÕES

20 mg c/28 comprimidos (2x14)
Reg. MS 1.2568.0262.002-0
Cód.: 18146

40 mg c/56 comprimidos (4x14)
Reg. MS 1.2568.0262.014-4
Cód.: 18149

40 mg c/28 comprimidos (2x14)
Reg. MS 1.2568.0262.012-8
Cód.: 18148

**Acesse a bula
do produto:**



Pratiprazol

Cápsula Dura de Liberação Retardada

LANÇAMENTO



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
OMEPRAZOLE – SANDOZ INC

CLASSE TERAPÊUTICA
Inibidores da Bomba de Prótons

Pratiprazol

Cápsula Dura de Liberação Retardada

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.


CLASSE TERAPÊUTICA - INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA 2 ANOS E MAIS DE 20KG

PARA QUE PRATIPRAZOL É INDICADO?

Pratiprazol cápsula de liberação retardada é indicado para:

- Tratamento de úlcera duodenal (intestino) em adultos;
- Tratamento de úlcera gástrica (estômago) benigna em adultos;
- Erradicação da bactéria *Helicobacter pylori* para reduzir o risco de retorno da úlcera duodenal (intestino) em adultos. Muitas vezes esse tratamento é realizado em combinação com antibióticos adequados como a claritromicina e amoxicilina;
- Tratamento da Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) sintomático (doença causada pela volta do conteúdo do estômago para o esôfago). O medicamento é indicado para o tratamento da azia e outros sintomas causados por essa doença em pacientes pediátricos acima de 2 anos e com mais de 20 Kg e adultos;
- Tratamento da Esofagite Erosiva (inflamação do esôfago) causada pelo Refluxo Gastroesofágico em pacientes pediátricos acima de 2 anos e com mais de 20 Kg e adultos;
- Manutenção da cicatrização da Esofagite Erosiva (inflamação do esôfago) causada pelo Refluxo Gastroesofágico em pacientes pediátricos acima de 2 anos e com mais de 20 Kg e adultos;
- Tratamento do excesso de produção de ácido no estômago em adultos causada por doenças como a síndrome de Zollinger-Ellison, adenomas endócrinos múltiplos e a mastocitose sistêmica.



COMO PRATIPRAZOL FUNCIONA?

Pratiprazol cápsulas de liberação retardada é um medicamento inibidor da bomba de prótons (IBP) e consequentemente reduz a quantidade de ácido no seu estômago.

O início da ação do omeprazol ocorre em uma hora, com o efeito máximo ocorrendo dentro de duas horas.

APRESENTAÇÕES

20mg c/28 cápsula dura d LR (2x14)
Reg. MS 1.2568.0337.004-4
Cód.: 22279

20mg c/28 cápsula dura d LR (4x14)
Reg. MS 1.2568.0337.007-9
Cód.: 22281

20mg c/28 cápsula dura d LR (6x14)
Reg. MS 1.2568.0337.009-5
Cód.: 22888

20mg c/28 cápsula dura d LR (2x14)
Reg. MS 1.2568.0337.069-9
Cód.: 22282

Acesse a bula do produto:



Prednisolona

Comprimido

G Medicamento
Genérico

**GENÉRICO
EXCLUSIVO**



Cód.: 19138/1x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

PRELONE/ACHÉ Laboratórios Farmacêuticos S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA

Glicocorticoides Sistêmicos

Prednisolona

Comprimido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
GLICOCORTICOIDES SISTÊMICOS


USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE A PREDNISOLONA É INDICADA?

Este medicamento é indicado como agente anti-inflamatório e imunossupressor em patologias cujos mecanismos fisiopatológicos envolvam processos inflamatórios e/ou autoimunes; para o tratamento de condições endócrinas (glândulas); e em composição de esquemas terapêuticos em algumas neoplasias.

COMO A PREDNISOLONA FUNCIONA?

Este é um medicamento à base de prednisolona com propriedades predominantes dos glicocorticoides (hormônios esteroides). Possui potente ação anti-inflamatória, antirreumática e antialérgica destinado ao tratamento de doenças que respondem aos corticosteroides.



APRESENTAÇÃO

20 mg comprimido (1x10)
Reg. MS 1.2568.0268.001-5
Cód.: 19138

**Acesse a bula
do produto:**



Prednisona

Comprimido

G Medicamento
Genérico



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
MERTICORTEN® - MERCK SHARP.

CLASSE TERAPÊUTICA
Glicocorticóides Sisteêmicos

Prednisona

Comprimido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
GLICOCORTICOIDES SISTÊMICOS

USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

PARA QUE A PREDNISONA É INDICADA?

Este medicamento é indicado para o tratamento de doenças endócrinas (doenças das glândulas), doenças osteomusculares (doenças dos ossos e músculos), distúrbios do colágeno (doenças que afetam vários órgãos e tem causa autoimune), doenças dermatológicas (doenças da pele), doenças alérgicas, doenças oftálmicas (doenças dos olhos), doenças respiratórias, doenças hematológicas (doenças do sangue), tumores e outras que respondam ao tratamento com corticosteroides.



COMO A PREDNISONA FUNCIONA?

Este medicamento contém prednisona, uma substância que proporciona potente efeito anti-inflamatório, antirreumático e antialérgico no tratamento de doenças que respondem a corticosteroides.

APRESENTAÇÃO

5 mg comprimido (1x20)
Reg. MS 1.2568.0160.001-8
Cód.: 4943

20 mg comprimido (1x10)
Reg. MS 1.2568.0160.004-2
Cód.: 4945

20 mg comprimido (1x20)
Reg. MS 1.2568.0160.005-0
Cód.: 4946

Acesse a bula do produto:



Propionato de Clobetasol

Solução Gotas

G Medicamento Genérico

 **Uso Capilar**



Cód.: 14991 / 50 g



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
PSOREX / GSK Brasil Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Glicocorticóides tópicos simples, exceto uso oftálmico

Propionato de Clobetasol

Solução Gotas

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
GLICOCORTICÓIDES TÓPICOS SIMPLES,
EXCETO USO OFTÁLMICO


SOLUÇÃO CAPILAR: USO CAPILAR (USO EXTERNO)
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 1 ANO

PARA QUE PROPIONATO DE CLOBETASOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de doenças inflamatórias do couro cabeludo, tais como eczemas recalcitrantes (difíceis de tratar) e psoríase.

COMO PROPIONATO DE CLOBETASOL FUNCIONA?

Este medicamento reduz os efeitos da inflamação em algumas doenças de pele, como eczemas difíceis de tratar e psoríase. O propionato de clobetasol pertence a um grupo de medicamentos chamados esteroides tópicos (ou seja, usados diretamente sobre a pele). Os esteroides tópicos reduzem a vermelhidão e a coceira provocadas por determinados problemas da pele. O tempo estimado para o início de ação deste medicamento é de uma semana após o início do tratamento.



APRESENTAÇÃO

0,5 mg/g solução gotas 50 g
Reg. MS 1.2568.0241.003-4
Cód.: 14991

Acesse a bula do produto:



Risperidona

Comprimido Revestido e Solução

G Medicamento Genérico

 Medicamento com Retenção de receita

 Acompanha Seringa Dosadora

*2



Cód.: 13487 / 30ml



Cód.: 19140/3x10



Cód.: 19141/3x10



Cód.: 19142/3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

1 - RISPERIDONA - COMPRIMIDO REVESTIDO
REFERÊNCIA: Risperdal \ Janssen Cilag Farmacêutica Ltda
CLASSE TERAPÊUTICA: Neurolépticos

***2 - RISPERIDONA - SOLUÇÃO**
REFERÊNCIA: RISPERDAL - Janssen Cilag Farmacêutica LTDA.
CLASSE TERAPÊUTICA: Neurolépticos

Risperidona

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – NEUROLÉPTICOS

USO ORAL – USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 5 ANOS



PARA QUE A RISPERIDONA É INDICADA?

Este medicamento é usado para tratar as assim chamadas psicoses (por exemplo, esquizofrenia). Isto significa que ele tem um efeito favorável sobre um certo número de transtornos relacionados ao pensamento, às emoções e/ou às atividades, tais como: confusão, alucinações, distúrbios da percepção (por exemplo, ouvir vozes de alguém que não está presente), desconfiança incomum, isolamento da sociedade, ser excessivamente introvertido, etc.

COMO A RISPERIDONA FUNCIONA?

Os medicamentos antipsicóticos afetam compostos químicos que permitem a comunicação entre as células nervosas (neurotransmissores).

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÕES

- 1 mg comprimido revestido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0269.005-3 - Cód.: 19140
- 2 mg comprimido revestido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0269.017-7 - Cód.: 19141
- 3 mg comprimido revestido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0269.029-0 - Cód.: 19142

Solução

CLASSE TERAPÊUTICA – NEUROLÉPTICOS

USO ORAL – USO ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 5 ANOS)



PARA QUE A RISPERIDONA É INDICADA?

Este medicamento é destinado ao tratamento de uma ampla gama de pacientes esquizofrênicos incluindo: A primeira manifestação da psicose; exacerbação esquizofrênicas agudas e crônicas e outros transtornos psicóticos nos quais os sintomas positivos (tais como alucinações, delírios, distúrbios do pensamento, hostilidade, desconfiança), e/ou negativos (tais como embotamento afetivo, isolamento emocional e social, pobreza de discurso) são proeminentes, dentre outras. Este medicamento também melhora a ansiedade, a tensão e o estado mental alterado por estes transtornos, além de controlar os transtornos de comportamento.

COMO A RISPERIDONA FUNCIONA?

Os medicamentos antipsicóticos afetam compostos químicos que permitem a comunicação entre as células nervosas (neurotransmissores). Estes compostos químicos são a dopamina e a serotonina. Não se sabe exatamente como este medicamento funciona. Entretanto, parece reajustar o equilíbrio entre a dopamina e a serotonina no organismo. O controle dos sintomas é observado com o decorrer do tratamento.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÕES

- 1 mg/ml solução oral 30 ml gotas + seringa dosadora - Reg. MS 1.2568.0232.003-5 - Cód.: 13487

Rivaroxabana

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico



Cód.: 24537 / 1x30



Cód.: 24541 / 1x30



Cód.: 24539 / 1x30



Cód.: 24538 / 2x30



Cód.: 24542 / 2x30



Cód.: 24540 / 2x30



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
XARELTO - BAYER S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA
Agente antitrombótico

FONTE:
IQVIA FMB JUN/2024 PPP

Rivaroxabana

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Comprimido Revestido 10 mg

CLASSE TERAPÊUTICA – AGENTE ANTITROMBÓTICO
USO ORAL – USO ADULTO

PARA QUE A RIVAROXABANA É INDICADA?

Este medicamento é usado para prevenir a formação de coágulos de sangue nas suas veias após cirurgia de substituição da articulação em seus joelhos ou quadril. Seu médico lhe prescreveu este medicamento porque após uma operação você tem risco aumentado de ter um coágulo de sangue.

Este medicamento é indicado para o tratamento de trombose nas veias profundas e prevenção de trombose nas veias profundas e embolia pulmonar recorrentes, em adultos.

Este medicamento é indicado para o tratamento de embolia pulmonar e para prevenção de embolia pulmonar e trombose nas veias profundas recorrentes, em adultos.

COMO A RIVAROXABANA FUNCIONA?

A substância ativa deste medicamento é a rivaroxabana, que pertence a um grupo de medicamentos chamados de agentes antitrombóticos, os quais impedem a formação do trombo, ou seja, impedem a coagulação do sangue no interior do vaso sanguíneo. A rivaroxabana age inibindo a ação do fator de coagulação Xa (elemento necessário para a formação do coágulo) e reduz assim a tendência do sangue formar coágulos.

Comprimido Revestido 15 mg e 20 mg

CLASSE TERAPÊUTICA – AGENTE ANTITROMBÓTICO
USO ORAL – USO ADULTO

PARA QUE A RIVAROXABANA É INDICADA?

Este medicamento é indicado para prevenção de derrame (AVC) e de formação de coágulo em outros vasos sanguíneos (embolia sistêmica) em pacientes adultos com arritmia do coração (fibrilação atrial não-valvular) que apresente um ou mais fatores de risco, como insuficiência cardíaca congestiva, pressão alta, 75 anos de idade ou mais, diabetes mellitus, derrame ou ataque isquêmico transitório anteriores.

Este medicamento é indicado para o tratamento de trombose nas veias profundas e prevenção de trombose nas veias profundas e embolia pulmonar recorrentes após trombose aguda nas veias profundas, em adultos.

Este medicamento é indicado para o tratamento de embolia pulmonar e para prevenção de embolia pulmonar e trombose nas veias profundas recorrentes, em adultos.

Este medicamento é indicado para o tratamento de tromboembolismo nas veias e prevenção de tromboembolismo nas veias recorrente, em crianças e adolescentes com menos de 18 anos com peso igual ou superior a 30 kg após o início do tratamento padrão de anticoagulação (vide **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**).

COMO A RIVAROXABANA FUNCIONA?

A substância ativa deste medicamento é a rivaroxabana, que pertence a um grupo de medicamentos chamados de agentes antitrombóticos, os quais impedem a formação do trombo, ou seja, impedem a coagulação do sangue no interior do vaso sanguíneo.

Este medicamento age inibindo a ação do fator de coagulação Xa (elemento necessário para a formação do coágulo) e reduz assim a tendência do sangue a formar coágulos.

Acesse a bula do produto:

APRESENTAÇÕES

- 10 mg c/ 30 comprimidos (1x30) - Reg. MS 1.2568.0336.004-9 - Cód.: 24537
- 10 mg c/ 60 comprimidos (2x30) - Reg. MS 1.2568.0336.005-7 - Cód.: 24538
- 15 mg c/ 30 comprimidos (1x30) - Reg. MS 1.2568.0336.014-6 - Cód.: 24541
- 15 mg c/ 60 comprimidos (2x30) - Reg. MS 1.2568.0336.010-3 - Cód.: 24540
- 20 mg c/ 30 comprimidos (1x30) - Reg. MS 1.2568.0336.009-1 - Cód.: 24539
- 20 mg c/ 60 comprimidos (2x30) - Reg. MS 1.2568.0336.015-4 - Cód.: 24542

Sulfametoxazol+ Trimetoprima

Comprimido

G Medicamento
Genérico

R Medicamento com
Retenção de receita

ATENÇÃO
Antibiótico
Medicamento

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**



Cód.: 12683 / 12x10

Cód.: 12687 / 12x10



Cód.: 8108 / 2x10

Cód.: 7034 / 1x10

REFERÊNCIA

Sulfametoxazol+Trimetoprima 400 mg/80 mg:
BACTRIM/Roche

Sulfametoxazol+Trimetoprima 800 mg/160 mg:
BACTRIM F/Roche

CLASSE TERAPÊUTICA

Trimetoprima em associação com sulfas

FONTE:

IQVIA MAT MARÇO/2022



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Sulfametoxazol+ Trimetoprima

Comprimido

CLASSE TERAPÊUTICA
TRIMETOPRIMA EM ASSOCIAÇÃO COM SULFAS

USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
(ACIMA DE 12 ANOS)
ATENÇÃO: ANTIBIÓTICO!



PARA QUE O SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de infecções causadas por micro-organismos sensíveis à associação dos medicamentos trimetoprima e sulfametoxazol, como certas infecções respiratórias, gastrintestinais, renais e do trato urinário, genitais (homens e mulheres), infecções da pele, entre outros tipos de infecções.

COMO O SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA FUNCIONA?

Este medicamento é um quimioterápico (medicamento sintetizado em laboratório para combater micro-organismos ou a multiplicação desordenada de células) com propriedades bactericidas (capaz de matar bactérias) e duplo mecanismo de ação. Este medicamento contém dois compostos ativos (sulfametoxazol + trimetoprima), que agem sinergicamente (ação conjunta, em que uma substância potencializa a outra), inibindo dois passos consecutivos da formação de uma substância necessária aos micro-organismos, que não conseguem mais se desenvolver. A ação medicamentosa deste medicamento começa logo após a primeira dose. No entanto, os micro-organismos não são eliminados de imediato. Por isso, mesmo que alguns sintomas como febre, dor, etc. desapareçam, é necessário continuar o tratamento pelo período estabelecido pelo seu médico.

APRESENTAÇÕES

- 400 mg + 80 mg c/ 20 comprimidos (2x10) - Reg. MS 1.2568.0209.001-3 - Cód.: 8108
- 400 mg + 80 mg c/ 120 comprimidos(12x10) - Embalagem Fracionável
Reg. MS 1.2568.0209.008-0 - Cód.: 12683
- 800 mg + 160 mg c/ 10 comprimidos (1x10) - Reg. MS 1.2568.0209.004-8 - Cód.: 7034
- 800 mg + 160 mg c/ 120 comprimidos(12x10) - Embalagem Fracionável
Reg. MS 1.2568.0209.012-9 - Cód.: 12687



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

**Acesse a bula
do produto:**



Sulfato de Salbutamol

Xarope

G Medicamento Genérico

 **NÃO CONTÉM AÇÚCAR**

 Acompanha Copo Medida



Cód.: 13280 / 120ml



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
AEROLIN / GSK Brasil Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Broncodilatadores

Sulfato de Salbutamol

Xarope




CLASSE TERAPÊUTICA – BRONCODILATADORES

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 2 ANOS)

PARA QUE O SULFATO DE SALBUTAMOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o controle e prevenção do ataque asmático e proporciona alívio do espasmo brônquico associado às crises de asma, bronquite crônica e enfisema.



COMO O SULFATO DE SALBUTAMOL FUNCIONA?

O sulfato de salbutamol pertence a um grupo de medicamentos chamados broncodilatadores. O salbutamol relaxa a musculatura das paredes dos brônquios, ajudando a abrir as vias aéreas e tornando mais fácil a entrada e a saída de ar dos pulmões. Dessa forma alivia o aperto no peito, o chiado e a tosse, permitindo que você respire com mais facilidade. O tempo para início de ação do sulfato de salbutamol xarope é cerca de 30 minutos. Este medicamento tem duração de ação de 4 a 6 horas, na maioria dos pacientes.

APRESENTAÇÃO

0,48 mg/ml xarope 120 ml
Reg. MS 1.2568.0030.017-7
Cód.: 13280

**Acesse a bula
do produto:**



Sulph

Creme



Medicamento com
Retenção de receita




ATENÇÃO
Antibiótico
Medicamento



Cód.: 23889 / 30g



Cód.: 23890 / 50g



Cód.: 23891 / 120g



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
DERMAZINE – SILVESTRE LABORATÓRIOS
QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA
Outros Produtos com Ação na Pele e Mucosas

Sulph

Creme

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – OUTROS PRODUTOS COM AÇÃO NA PELE E MUCOSAS

USO DERMATOLÓGICO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 MESES


PARA QUE O SULPH É INDICADO?

Sulph trata de feridas principalmente aquelas com grande potencial de infecção e risco de evolução para infecção generalizada: queimaduras, úlceras de perna, escaras de decúbito e feridas cirúrgicas.



COMO O SULPH FUNCIONA?

Sulph é um agente cicatrizante e antimicrobiano tópico na terapia de queimaduras, feridas cirúrgicas, úlceras e escaras infectadas. Previne infecções nos cateterismos vasculares. A ação inicia-se no momento da aplicação.



APRESENTAÇÃO

10mg/g creme 30g
Reg. MS 1.2568.0334.001-3
Cód.: 23889

10mg/g creme 50g
Reg. MS 1.2568.0334.003-1
Cód.: 23890

10mg/g creme 120g
Reg. MS 1.2568.0334.005-6
Cód.: 23891

Acesse a bula do produto:



Tadalafila

Comprimido Revestido

G Medicamento
Genérico

**APRESENTAÇÃO
EXCLUSIVA**



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

CIALIS / Eli Lilly do Brasil Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA
Vasodilatadores

FONTE:

IQVIA MAT MARÇO/2022

Tadalafila

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – VASODILATADORES

USO ORAL - USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS

PARA QUE A TADALAFILA É INDICADA?

Este medicamento é indicado para o tratamento da disfunção erétil.



COMO A TADALAFILA FUNCIONA?

Definição de disfunção erétil: Quando existe um estímulo sexual, o pênis se enche de sangue e o homem tem uma ereção. Se o homem tiver disfunção erétil (DE), o pênis não se enche de sangue de forma adequada e a ereção não é suficiente para ocorrer uma relação sexual. A disfunção erétil, também chamada de impotência sexual, pode ter diversas causas. É importante consultar um médico para descobrir a natureza desse problema. Este medicamento pode ajudar o homem com DE a obter e manter uma ereção quando estiver sexualmente excitado. Ação do medicamento: Este é um medicamento para o tratamento da dificuldade de obtenção e/ou manutenção da ereção do pênis (disfunção erétil). Quando um homem é sexualmente estimulado, a resposta física normal do seu corpo é o aumento do fluxo sanguíneo no pênis. Isso resulta em uma ereção. Este medicamento ajuda a aumentar o fluxo de sangue no pênis e pode auxiliar homens com disfunção erétil a obterem e manterem uma ereção satisfatória para a atividade sexual. Uma vez completa a atividade sexual, o fluxo sanguíneo do pênis diminui e a ereção termina. Para este medicamento funcionar, é necessário uma excitação sexual. O homem não terá uma ereção apenas por tomar um comprimido deste medicamento, sem a estimulação sexual. Este medicamento age, em média, a partir de 30 minutos, podendo ter ação por até 36 horas.

APRESENTAÇÕES

- 20 mg comprimido revestido (1x2) - Reg. MS 1.2568.0248.002-4 - Cód.: 16126
- 20 mg comprimido revestido (2x4) - Reg. MS 1.2568.0248.004-0 - Cód.: 18886
- 20 mg comprimido revestido (2x2) - Reg. MS 1.2568.0248.003-2 - Cód.: 16127
- 20 mg comprimido revestido (20x3) - Reg. MS 1.2568.0248.006-7 - Cód.: 17005 - Embalagem Fracionada

Acesse a bula do produto:



Tartarato de Metoprolol

Comprimido Revestido

G Medicamento Genérico



Cód.: 20084 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
LOPRESSOR – NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.

CLASSE TERAPÊUTICA
Betabloqueadores Simples

Tartarato de Metoprolol

Comprimido Revestido




CLASSE TERAPÊUTICA – BETABLOQUEADORES SIMPLES

Uso ORAL - Uso ADULTO

PARA QUE TARTARATO DE METOPROLOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para taquiarritmia cardíaca, inclusive arritmias ventriculares e supraventriculares; Infarto agudo do miocárdio suspeito ou confirmado; para prevenção secundária após infarto do miocárdio; Hipertensão (pressão alta): como monoterapia ou em associação com outros anti-hipertensivos, como por exemplo, diuréticos, vasodilatadores periféricos ou inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECAs); Angina do peito (dor do peito): para profilaxia em longo prazo. Hipertireoidismo (como medicação coadjuvante); Distúrbios cardíacos funcionais com palpitação (sensação de que o coração está acelerado ou batendo mais forte); Prevenção da enxaqueca.



COMO TARTARATO DE METOPROLOL FUNCIONA?

Este medicamento pertence a um grupo de medicamentos chamados de betabloqueadores. Eles reduzem a pressão sanguínea nas veias por distender os vasos sanguíneos.

APRESENTAÇÃO

100 mg comprimido revestido (3x10)

Reg. MS 1.2568.0312.001-3

Cód.: 20084

**Acesse a bula
do produto:**



Tioconazol + Tinidazol

Creme

G Medicamento
Genérico

Acompanha
7 Aplicadores
Ginecológicos



Cód.: 174 / 35g



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

CARTRAX / Laboratórios Pfizer Ltda.

CLASSE TERAPÊUTICA

Produtos ginecológicos antifúngicos tópicos
Associações medicamentosas

Tioconazol + Tinidazol Creme

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA

PRODUTOS GINECOLÓGICOS ANTI-INFECCIOSOS TÓPICOS

ASSOCIAÇÕES MEDICAMENTOSAS

USO VAGINAL - USO ADULTO

PARA QUE O TIOCONAZOL + TINIDAZOL É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de infecções vaginais (infecções e inflamações da vulva – região externa dos genitais femininos - e da vagina) causadas por Candida (um tipo de fungo), Trichomonas (um tipo de protozoário) e Gardnerella (um tipo de bactéria) ou infecções mistas (por mais de um destes micro-organismos).



COMO O TIOCONAZOL + TINIDAZOL FUNCIONA?

Este medicamento tem ação antifúngica (age contra micro-organismos fúngicos causadores de infecção) e ação contra alguns tipos de protozoários e bactérias. Após ser aplicado por via intravaginal (dentro da vagina) a medicação é encontrada na secreção da vagina por 24-72 horas.

**Acesse a bula
do produto:**



APRESENTAÇÃO

20 mg/g + 30 mg/g creme 35 g + 7 aplicadores ginecológicos

Reg. MS 1.2568.0086.005-9

Cód.: 174

Triancinolona Acetonida

Pomada

G Medicamento
Genérico



Cód.: 108 / 10g



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

OMCILON A ORABASE / Bristol-Myers Squibb do Brasil

CLASSE TERAPÊUTICA

Glicocorticóides tópico simples exceto uso oftálmico

Triancinolona Acetonida

Pomada



CLASSE TERAPÊUTICA

GLICOCORTICÓIDES TÓPICOS SIMPLES EXCETO USO OFTÁLMICO

Uso BUCAL - Uso ADULTO

PARA QUE A TRIANCINOLONA ACETONIDA É INDICADA?

Triancinolona acetonida é um corticosteroide sintético que possui ação anti-inflamatória atuando no alívio temporário de sintomas associados com lesões inflamatórias orais e lesões ulcerativas resultantes de trauma.



COMO A TRIANCINOLONA ACETONIDA FUNCIONA?

A triancinolona acetonida é um corticosteroide sintético que possui ação anti-inflamatória, antipruriginosa e antialérgica (age diminuindo a inflamação, coceira e reações alérgicas da mucosa oral). Componentes da fórmula atuam como um veículo adesivo para aplicar a medicação ativa aos tecidos orais. O veículo proporciona uma cobertura protetora que pode servir para reduzir temporariamente a dor, associada com irritação oral.

APRESENTAÇÃO

1 mg/g pomada bucal 10 g
Reg. MS 1.2568.0122.001-0
Cód.: 108

**Acesse a bula
do produto:**



Valproato de Sódio

Xarope



Cód.: 13919 / 100ml

G Medicamento Genérico

R Medicamento com Retenção de receita

C Acompanha Copo Medida

S Sabor Cereja

C Medicamento de Controle especial



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

DEPAKENE - Abbott Laboratórios do Brasil LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA

Anticonvulsivantes

Valproato de Sódio

Xarope

SABOR CEREJA



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTICONVULSIVANTES

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS

OBS: MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98 LISTA C1

PARA QUE O VALPROATO DE SÓDIO É INDICADO?

Epilepsia: este medicamento é destinado, isoladamente ou em combinação a outros medicamentos, no tratamento de pacientes (adultos e crianças acima de 10 anos) com crises parciais complexas, que ocorrem tanto de forma isolada quanto em associação com outros tipos de crises convulsivas, e no tratamento de quadros de ausência simples e complexa. Ausência simples é definida como breve perda dos sentidos ou perda de consciência, acompanhada por determinadas descargas epiléticas generalizadas, sem outros sinais clínicos detectáveis. Ausência complexa é a expressão utilizada quando outros sinais também estão presentes.



COMO O VALPROATO DE SÓDIO FUNCIONA?

O valproato de sódio é a substância ativa deste medicamento, que é convertido a ácido valproico e este se dissocia em íon valproato no trato gastrointestinal. O mecanismo de ação deste medicamento ainda não é conhecido, mas sua atividade parece estar relacionada com o aumento dos níveis do ácido gama-aminobutírico (GABA) no cérebro. O tratamento com valproato de sódio, em alguns casos, pode produzir sinais de melhora já nos primeiros dias de tratamento; em outros casos, é necessário um tempo maior para se alcançar os efeitos benéficos. Seu médico dará a orientação no seu caso.

Acesse a bula do produto:



APRESENTAÇÃO

50 mg/ml xarope 100 ml

Reg. MS 1.2568.0234.002-8

Cód.: 13919

Valproato de Sódio

Comprimido Revestido de Liberação Retardada

G Medicamento Genérico

C Medicamento de Controle especial



Cód.: 20745/ 1x25



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA

DEPAKENE - Abbott Laboratórios do Brasil LTDA.

CLASSE TERAPÊUTICA

Anticonvulsivantes

Valproato de Sódio

Comprimido Revestido de Liberação Retardada



CLASSE TERAPÊUTICA – ANTICONVULSIVANTES

USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS

PARA QUE O VALPROATO DE SÓDIO É INDICADO?

Epilepsia: este medicamento é indicado isoladamente ou em combinação a outros medicamentos, no tratamento de pacientes adultos e crianças acima de 10 anos com crises parciais complexas, que ocorrem tanto de forma isolada ou em associação com outros tipos de crises. Também é indicado isoladamente ou em combinação a outros medicamentos no tratamento de quadros de ausência simples e complexa em pacientes adultos e crianças acima de 10 anos, e como terapia adjuvante em adultos e crianças acima de 10 anos com crises de múltiplos tipos, que inclui crises de ausência.



COMO O VALPROATO DE SÓDIO FUNCIONA?

O valproato de sódio é a substância ativa deste medicamento que é convertido a ácido valproico e este se dissocia em íon valproato no trato gastrointestinal. O tratamento com este medicamento, em alguns casos, pode produzir sinais de melhora já nos primeiros dias de tratamento; em outros casos, é necessário um tempo maior para se alcançar os efeitos benéficos. Seu médico dará a orientação no seu caso.

APRESENTAÇÃO

300 mg comprimido revestido de liberação retardada
Reg. MS 1.2568.0301.001-3
Cód.: 20745

Acesse a bula do produto:



MEDICAMENTOS

LINHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA



Evolução para a vida

...



O futuro da saúde hoje!



Uma empresa que faz
a diferença na vida dos

BRASILEIROS!



Em 2019 a Prati-Donaduzzi ingressou na área de Prescrição Médica com medicamentos voltados para o Sistema Nervoso Central (SNC) e indicados para tratar doenças como: epilepsia, Alzheimer, ansiedade, depressão, dor neuropática, esquizofrenia, autismo, bipolaridade e insônia. Já são mais de 10 medicamentos compondo o portfólio de produtos.

O Canabidiol Prati-Donaduzzi é o primeiro produto brasileiro à base de Cannabis autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

O produto é produzido a partir do princípio ativo puro, ou seja, contendo somente o Canabidiol, sem nenhuma outra substância da Cannabis, já que a grande maioria delas não tem estudos científicos que comprovem sua atividade e segurança. O produto é livre de THC (tetrahydrocannabinol) – composto psicoativo.

A Prati-Donaduzzi possui em comercialização três apresentações, sendo nas concentrações de 20 mg/ml, 50 mg/ml e 200 mg/ml. Os produtos são apresentados ao consumidor em forma de solução oral em frascos com 30ml. As diferentes concentrações ampliam a acessibilidade ao tratamento para diferentes patologias.

A linha SNC são medicamentos que devem ser prescritos pelos médicos. Dividem-se em:

TARJA	PRESCRIÇÃO	VENDA	RECEITA
Vermelha	Sob prescrição médica	Sem retenção de receita	Branca simples (em uma via)
Vermelha Antibiótico	Sob prescrição médica	Com retenção da 2ª via da receita e escrituração via SNGPC*	Branca simples (em duas vias)
	Fracionado	Com retenção da 2ª via da receita	Branca simples (em duas vias)
Vermelha Portaria 344/98	Sob prescrição médica	Com retenção da 1ª via da receita e escrituração via SNGPC*	Branca especial (em duas vias)
Preta Portaria 344/98	Sob prescrição médica	Com notificação da receita B	Azul acompanhada de receita branca


Canabidiol Prati-Donaduzzi Solução Oral



Medicamento de
Controle especial



Cód.: 24963 / 30ml



Cód.: 24964 / 30ml



Cód.: 20815 / 30ml

Acesse o folheto
informativo do produto:



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos que atuam sobre o sistema nervoso

APRESENTAÇÕES

- 20mg/ml solução oral (30ml) - Reg. MS 1.2568.0313.004-3 - Cód.: 24963
- 50mg/ml solução oral (30ml) - Reg. MS 1.2568.0313.006-1 - Cód.: 24964
- 200mg/ml solução oral (30ml) - Reg. MS 1.2568.0313.001-9 - Cód.: 20815

Canabidiol Prati-Donaduzzi

Solução em Gotas

SNC
prati-donaduzzi



Medicamento de
Controle especial



Cód.: 24690/ 10ml

**Acesse o folheto
informativo do produto:**



CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos que atuam sobre o sistema nervoso

APRESENTAÇÕES

• 20mg/ml solução gotas (10ml) - Reg. MS 1.2568.0313.008-6 - Cód.: 24690



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

Elatium

Bromidrato de Galantamina

Cápsula Dura de Liberação Prolongada



Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 20551 / 3x10

Cód.: 20552 / 3x10

Cód.: 20553 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
Outros produtos que atuam
sobre o sistema nervoso

Elatium

Bromidrato de Galantamina

Cápsula Dura de Liberação Prolongada

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – OUTROS PRODUTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO

**USO ORAL
USO ADULTO**

**MEDICAMENTO CONTROLADO PORTARIA
344/98 – LISTA C1**




PARA QUE O ELATIUM É INDICADO?

Este medicamento é usado para tratar a demência do tipo alzheimer de intensidade leve a moderada com ou sem doença vascular cerebral relevante. Os sintomas desta doença, que altera o funcionamento do cérebro, incluem perda progressiva da memória, confusão crescente e problemas de comportamento, o que torna cada vez mais difícil realizar as atividades diárias.

COMO O ELATIUM FUNCIONA?

Este medicamento contém a substância ativa bromidrato de galantamina. Acredita-se que a demência do tipo Alzheimer ocorra devido à falta de acetilcolina, uma substância responsável pela transmissão das mensagens entre as células do cérebro. O bromidrato de galantamina aumenta a quantidade desta substância, exercendo efeito benéfico sobre os sintomas da doença. Os sintomas da demência do tipo Alzheimer diminuem gradativamente depois de algumas semanas.



APRESENTAÇÕES

8 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0286.002-1
Cód.: 20551

16 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0286.006-4
Cód.: 20552

24 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0286.011-0
Cód.: 20553

**Acesse a bula
do produto:**



Gapem

Gabapentina

Cápsula Dura



Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 20575 / 3x10

Cód.: 20573 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
Anticonvulsivantes

Gapem

Gabapentina

Cápsula Dura

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTICONVULSIVANTES

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS (APENAS PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA)

MEDICAMENTO CONTROLADO PORTARIA 344/98 – LISTA C1




PARA QUE O GAPEM É INDICADO?

Este medicamento é indicado para: tratamento da dor neuropática (dor devido à lesão e/ou mau funcionamento dos nervos e/ou do sistema nervoso) em adultos; como monoterapia (uso apenas de gabapentina) e terapia adjunta das crises epiléticas parciais (convulsões), com ou sem generalização secundária (crise com maior comprometimento do sistema nervoso central acompanhada de perda da consciência), em pacientes a partir de 12 anos de idade.

COMO O GAPEM FUNCIONA?

Supõe-se que este medicamento atue modulando (regulando) o trânsito das mensagens entre as células do sistema nervoso, reduzindo a atividade excitatória responsável pela dor neuropática e pelas crises convulsivas. No entanto o seu mecanismo não é totalmente conhecido.



APRESENTAÇÕES

300 mg cápsula dura (3x10)	400 mg cápsula dura (3x10)
Reg. MS 1.2568.0296.002-6	Reg. MS 1.2568.0296.008-5
Cód.: 20573	Cód.: 20575

Acesse a bula do produto:



Harip

Aripiprazol

Comprimido

SNC
prati-donaduzzi



**Medicamento com
Retenção de receita**



Cód.: 20996 / 2x15

Cód.: 20999 / 2x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antipsicóticos.

Harip

Aripiprazol

Comprimido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTIPSICÓTICOS

USO ORAL

USO ADULTO




PARA QUE O HARIP É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de esquizofrenia. Transtorno Bipolar - Monoterapia: este medicamento é indicado para o tratamento agudo e de manutenção de episódios de mania e mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I. Terapia adjuntiva (terapia complementar à terapia principal): este medicamento é indicado como terapia complementar à terapia com lítio ou valproato para o tratamento agudo de episódios de mania ou mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I.

COMO O HARIP FUNCIONA?

O mecanismo de ação do aripiprazol, como ocorre com outras drogas eficazes no tratamento de esquizofrenia e transtorno bipolar, é desconhecido. No entanto, foi proposto que a eficácia do aripiprazol é mediada por efeitos em receptores no sistema nervoso central. A atividade deste medicamento é principalmente devida à droga inalterada, aripiprazol, e em menor medida ao seu metabólito principal, dehidro-aripiprazol.



APRESENTAÇÕES

10 mg comprimido (3x10)

Reg. MS 1.2568.0308.003-8

Cód.: 20996

15 mg comprimido (3x10)

Reg. MS 1.2568.0308.009-7

Cód.: 20999

**Acesse a bula
do produto:**



Lavie

Valproato de Sódio

Xarope

SNC
prati-donaduzzi



**Medicamento com
Retenção de receita**



**Acompanha
Copo Medida**



**Sabor
Cereja**



Cód.: 20561 / 100ml



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
Anticonvulsivantes

Lavie

Valproato de Sódio

Xarope

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA – ANTICONVULSIVANTES

USO ORAL

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 10 ANOS**

SABOR CEREJA



OBS: MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98 - LISTA C1

PARA QUE O LAVIE É INDICADO?

Epilepsia: este medicamento é destinado, isoladamente ou em combinação a outros medicamentos, no tratamento de pacientes (adultos e crianças acima de 10 anos) com crises parciais complexas, que ocorrem tanto de forma isolada quanto em associação com outros tipos de crises convulsivas, e no tratamento de quadros de ausência simples e complexa. Ausência simples é definida como breve perda dos sentidos ou perda de consciência, acompanhada por determinadas descargas epiléticas generalizadas, sem outros sinais clínicos detectáveis. Ausência complexa é a expressão utilizada quando outros sinais também estão presentes.

COMO O LAVIE FUNCIONA?


O valproato de sódio é a substância ativa deste medicamento, que é convertido a ácido valproico e este se dissocia em íon valproato no trato gastrointestinal. O mecanismo de ação deste medicamento ainda não é conhecido, mas sua atividade parece estar relacionada com o aumento dos níveis do ácido gama-aminobutírico (GABA) no cérebro. O tratamento com valproato de sódio, em alguns casos, pode produzir sinais de melhora já nos primeiros dias de tratamento; em outros casos, é necessário um tempo maior para se alcançar os efeitos benéficos. Seu médico dará a orientação no seu caso.

APRESENTAÇÃO

50 mg/ml xarope 100 ml

Reg. MS 1.2568.0287.002-7

Cód.: 20561



Acesse a bula do produto:



Maizher

Cloridrato de Memantina

Comprimido Revestido

SNC
prati-donaduzzi



**Medicamento com
Retenção de receita**



Cód.: 20562 / 3x10

Cód.: 20563 / 6x10

Cód.: 20564 / 12x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA

Outros produtos que atuam sobre o sistema nervoso

Maizher

Cloridrato de Memantina Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

**CLASSE TERAPÊUTICA – OUTROS PRODUTOS QUE
ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO**

**USO ORAL
USO ADULTO**




PARA QUE O MAIZHER É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento da doença de Alzheimer moderada a grave.

COMO O MAIZHER FUNCIONA?

A perda de memória associada à doença de Alzheimer deve-se a alterações na transmissão de sinais no cérebro. O cérebro contém receptores do tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) envolvidos na transmissão de sinais nervosos em áreas importantes para aprendizagem e memória. O cloridrato de memantina é um antagonista dos receptores NMDA; ele atua nestes receptores, melhorando a transmissão dos sinais nervosos e a memória.



APRESENTAÇÕES

10 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0289.002-8
Cód.: 20562

10 mg comprimido (60 cps)
Reg. MS 1.2568.0289.003-6
Cód.: 20563

10 mg comprimido (120 cps)
Reg. MS 1.2568.0289.005-2
Cód.: 20564

**Acesse a bula
do produto:**



Nypram

Bromidrato de Citalopram

Comprimido Revestido

**SNC**
prati-donaduzzi

**Medicamento com
Retenção de receita**



Cód.: 20922 / 2x15



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antidepressivos

Nypram

Bromidrato de Citalopram Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.




PARA QUE O NYPRAM É INDICADO?

Este medicamento é indicado para tratar a depressão e, após a melhora, para prevenir a recorrência desses sintomas. É usado em tratamentos de longo prazo para prevenir a recorrência de novos episódios depressivos em pacientes que tem depressão recorrente. É eficaz também para o tratamento de pacientes com transtorno do pânico e para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC).

COMO O NYPRAM FUNCIONA?

Nypram é um medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), que é uma classe do grupo dos antidepressivos. Este medicamento age no cérebro, onde corrige as concentrações inadequadas de determinadas substâncias denominadas neurotransmissores, em especial a serotonina, que causam os sintomas na situação de doença.



APRESENTAÇÃO

20 mg comprimido (3x10)

Reg. MS 1.2568.0303.013-8

Cód.: 20922

**Acesse a bula
do produto:**



Onaz

Olanzapina

Comprimido Revestido

SNC
prati-donaduzzi



**Medicamento com
Retenção de receita**



Cód.: 20570 / 2x15

Cód.: 20571 / 3x10

Cód.: 20572 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
Antipsicóticos

Onaz

Olanzapina

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA - ANTIPSICÓTICOS

USO ORAL

USO ADULTO



PARA QUE A ONAZ É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento agudo e de manutenção da esquizofrenia e outros transtornos mentais (psicoses) em adultos, nos quais sintomas positivos (exemplo: delírios, alucinações, alterações de pensamento, hostilidade e desconfiança) e/ou sintomas negativos (exemplo: afeto diminuído, isolamento emocional/social e pobreza de linguagem) são proeminentes. Este medicamento alivia também os sintomas afetivos secundários na esquizofrenia e os transtornos relacionados. Este medicamento é eficaz na manutenção da melhora clínica durante o tratamento contínuo nos pacientes adultos que responderam ao tratamento inicial. Este medicamento, em monoterapia ou em combinação com lítio ou valproato, é indicado para o tratamento de episódios de mania aguda ou mistos de transtorno bipolar em pacientes adultos, com ou sem sintomas psicóticos e, com ou sem ciclagem rápida. Este medicamento é indicado para prolongar o tempo entre os episódios e reduzir as taxas de recorrência dos episódios de mania, mistos ou depressivos, no transtorno bipolar.

COMO A ONAZ FUNCIONA?


Este medicamento é classificado como antipsicótico e que age no Sistema Nervoso Central, ocasionando a melhora dos sintomas em pacientes com esquizofrenia e outros transtornos mentais (psicoses), e dos episódios maníacos (euforia) e mistos do transtorno afetivo bipolar. Além disso, nos pacientes com transtorno afetivo bipolar, previne novas fases de mania e depressão. O mecanismo de ação deste medicamento no tratamento da esquizofrenia e no tratamento de episódios de mania aguda ou mistos, do transtorno bipolar é desconhecido. Quando este medicamento é utilizado por via oral (pela boca), em doses diárias entre 5 e 20 mg, para o tratamento da esquizofrenia e outras condições relacionadas, ou em doses diárias de pelo menos 15 mg para o tratamento de mania (ou episódios mistos) associada a transtorno bipolar, você e/ou o seu médico podem verificar uma melhora inicial nos sintomas gerais destas condições na primeira semana de tratamento.

APRESENTAÇÕES

2,5 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0293.007-0
Cód.: 20570

5 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0293.019-4
Cód.: 20571

10 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0293.032-1
Cód.: 20572



Acesse a bula do produto:



Perlid

Risperidona

Comprimido Revestido e Solução Oral

SNC
prati-donaduzzi



**Medicamento com
Retenção de receita**



**Acompanha
Seringa
Dosadora**



Cód.: 20565 / 2x15

Cód.: 20566 / 2x15

Cód.: 20567 / 2x15

Cód.: 20568 / 30ml



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
Neurolépticos

Perlid

Risperidona

Comprimido Revestido e Solução Oral

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

**CLASSE TERAPÊUTICA –
NEUROLÉPTICOS**



USO ORAL


USO ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 5 ANOS)

PARA QUE O PERLID É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de uma ampla gama de pacientes esquizofrênicos incluindo: A primeira manifestação da psicose; exacerbação esquizofrênicas agudas e crônicas e outros transtornos psicóticos nos quais os sintomas positivos (tais como alucinações, delírios, distúrbios do pensamento, hostilidade, desconfiança), e/ou negativos (tais como embotamento afetivo, isolamento emocional e social, pobreza de discurso) são proeminentes, dentre outras. Este medicamento também melhora a ansiedade, a tensão e o estado mental alterado por estes transtornos, além de controlar os transtornos de comportamento.

COMO O PERLID FUNCIONA?

Os medicamentos antipsicóticos afetam compostos químicos que permitem a comunicação entre as células nervosas (neurotransmissores). Estes compostos químicos são a dopamina e a serotonina. Não se sabe exatamente como este medicamento funciona. Entretanto, parece reajustar o equilíbrio entre a dopamina e a serotonina no organismo. O controle dos sintomas é observado com o decorrer do tratamento.



APRESENTAÇÕES

1 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0291.003-7
Cód.: 20565

2 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0291.015-0
Cód.: 20566

3 mg comprimido (30 cps)
Reg. MS 1.2568.0291.027-4
Cód.: 20567

1 mg/ml solução 30 ml gotas + seringa dosadora
Reg. MS 1.2568.0292.003-2
Cód.: 20568

**Acesse a bula
do produto:**



Ralzin

Comprimido Revestido - Sulcado



Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 22872/1x10

Cód.: 22887/3x10

Cód.: 22886/2x15

Cód.: 24841/4x15

Cód.: 24840/6x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

REFERÊNCIA
ZOLOFT - LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

CLASSE TERAPÊUTICA
Antidepressivos

Ralzin

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

Comprimido Revestido - Sulcado

CLASSE TERAPÊUTICA
ANTIDEPRESSIVOS**USO ORAL****USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS DE IDADE (VIDE INDICAÇÕES)**

PARA QUE O RALZIN É INDICADA?

Ralzin (cloridrato de sertralina) é indicado para uso adulto nos seguintes tratamentos: sintomas de depressão, incluindo depressão acompanhada por sintomas de ansiedade, em pacientes com ou sem história de mania; transtorno do pânico; transtorno do estresse pós-traumático; fobia social ou transtorno de ansiedade social e; sintomas da síndrome da tensão pré-menstrual e/ou transtorno disfórico pré-menstrual.

Ralzin (cloridrato de sertralina) é indicado para uso adulto e para crianças acima de 6 anos de idade no transtorno obsessivo compulsivo.



COMO RALZIN FUNCIONA?

Ralzin (cloridrato de sertralina) age sobre uma substância encontrada no cérebro, chamada de serotonina, aumentando sua disponibilidade e com isso aliviando os sintomas depressivos e ansiosos, típicos dos transtornos para os quais é indicado.

Ralzin (cloridrato de sertralina) começa agir em 7 dias. O tempo necessário para se observar melhora clínica pode variar e depende das características do paciente e do tipo de transtorno em tratamento.

APRESENTAÇÕES

- 50 mg comprimido revestido (1x10) - Reg. MS 1.2568.0326.031-1 - Cód.: 22872
- 50 mg comprimido revestido (2x15) - Reg. MS 1.2568.0326.002-8 - Cód.: 22886
- 50 mg comprimido revestido (4x15) - Reg. MS 1.2568.0326.003-6 - Cód.: 24841
- 100 mg comprimido revestido (3x10) - Reg. MS 1.2568.0326.014-1 - Cód.: 22887
- 100 mg comprimido revestido (6x10) - Reg. MS 1.2568.0326.015-1 - Cód.: 24840

Acesse a bula do produto:

Zapsy

Mirtazapina

Comprimido Revestido



Medicamento com
Retenção de receita



Cód.: 21981 / 3x10

Cód.: 21984 / 3x10



ATENÇÃO

Uso restrito ao profissional
de saúde e força de vendas.

CLASSE TERAPÊUTICA
Neurólépticos

Zapsy

Mirtazapina

Comprimido Revestido

**ATENÇÃO**

Uso restrito ao profissional de saúde e força de vendas.

**CLASSE TERAPÊUTICA –
NEUROLÉPTICOS**

USO ORAL


USO ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 5 ANOS)

PARA QUE O ZAPSY É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de estados depressivos.

COMO O ZAPSY FUNCIONA?

A mirtazapina é um medicamento pertencente à classe dos antidepressivos. Estes medicamentos atuam sobre as funções químicas desbalanceadas em seu cérebro responsáveis pela depressão.



APRESENTAÇÕES

30 mg comprimido revestido (3x10)

Reg. MS 1.2568.0316.003-1

Cód.: 21981

45 mg comprimido revestido (3x10)

Reg. MS 1.2568.0316.012-0

Cód.: 21984

**Acesse a bula
do produto:**



Estamos construindo o futuro da saúde.



@pratidonaduzzi



/pratidonaduzzi



/pratidonaduzzi




pratidonaduzzi1



www.pratidonaduzzi.com.br



Evolução que
transforma
vidas.





 @pratidonaduzzi

 /pratidonaduzzi

 /pratidonaduzzi

 pratidonaduzzi1

 www.pratidonaduzzi.com.br

**Rua Mitsugoro Tanaka, 145
Centro Industrial Nilton Arruda
Toledo - PR CEP 85903-630**